A 99
364A
Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

SUPPLÉMENT

AUX

CATALOGUES

1863

Fleurs
annuelles
vivaces.

—

Arbustes
de pleine terre.

—

Plantes
de serre chaude,
de serre tempérée

Plantes
potagères,
fourragères,
économiques.

—

Fraisiers.

—

Arbres fruitiers.

—

Etc.

PARIS

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

MARCHANDS GRAINIERS, FLEURISTES ET PÉPINIÉRISTES,

30, quai de la Mégisserie, 30.

MODES D'EXPÉDITION

POSTE. — Nous expédierons **franco à destination, pour toute la France et pour l'Algérie, par la poste**, toute demande qui nous aura été réglée à l'avance :

1° De *graines de fleurs* en **paquets**, quelle qu'en soit l'importance ;

2° De *graines diverses* d'une valeur de 15 *francs* au moins, dont le poids n'excédera pas 300 grammes, y compris l'emballage, et ne cubant pas au delà de 25 centimètres, suivant le tarif de la poste.

Le prix de l'affranchissement **pour les demandes sortant des conditions ci-dessus** est de 1 cent. par chaque 5 grammes jusqu'à 50 grammes ;
10 cent. pour 50 grammes et au-dessus jusqu'à 100 grammes ;
1 cent. par chaque 10 grammes ou fractions de 10 grammes en plus de 100 grammes, jusqu'à 300 grammes, soit 20 cent. pour 200 grammes et 30 cent. pour 300 grammes.

La poste ne reçoit pas de paquets excédant ce poids et le cube indiqué ci-dessus.
Lesdits affranchissements seront portés en compte.

CHEMINS DE FER, MESSAGERS, etc. — Nous expédierons, par les chemins de fer ou par les autres voies, les paquets et articles dont la nature, le volume ou le poids ne permettent pas l'envoi par la poste.

Nous prions nos Correspondants de nous indiquer clairement, lors de chacune de leurs demandes, leur adresse, et de quelle manière ils souhaitent que les expéditions leur soient faites, si par *grande* ou par *petite vitesse*.

En général, la grande vitesse n'occasionne pas de frais supérieurs à la petite vitesse pour les colis qui n'atteignent pas 10, 15 et même 20 kilogr. pour certaines lignes.

Nous affranchirons les envois lorsqu'on nous en fera la demande, et le prix du transport sera porté en compte.

RECOUVREMENTS

Les recouvrements seront effectués selon les convenances de nos Correspondants, qui sont priés de nous les faire connaître.

On peut aussi nous faire la remise de **Timbres-poste** (pour les sommes peu importantes), de **Mandats sur la Poste** ou de **Bons sur Paris**.

Remise pour Marchands applicable **AU PRÉSENT CATALOGUE SEULEMENT**. — Tous les paquets cotés 40 c. seront réduits à 25 c.; ceux de 60 c. à 40 c.; ceux de 75 c. à 50 c.

Une remise de 25 pour 100 sera accordée sur les prix *des autres articles graines compris dans ce catalogue*.

Sur les prix des Arbres et Plantes vives, nous ferons une remise de 10 pour 100.

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

SUPPLÉMENT
AUX CATALOGUES

POUR L'ANNÉE 1863

31 janvier 1863.

Nous publions avec quelques modifications ce supplément annuel à nos catalogues. — L'*Extrait de nos Catalogues généraux* qui accompagne cette feuille nous permet de ne mentionner ici que les *nouveautés de l'année;* l'abrégé de nos Catalogues suppléera la partie que nous consacrions habituellement à une mention assez étendue de plantes anciennes ou nouvelles qui nous paraissent mériter d'être essayées ou d'être plus répandues.

Nous avons décrit avec quelque développement les plantes qui nous sont connues, mais nous devons nous contenter d'une *simple mention* pour toutes celles que nous n'avons pas encore cultivées ou que nous ne connaissons pas (1). Nous nous abstenons même de les recommander, ne sachant que trop par une longue et coûteuse expérience, que parmi un grand nombre de nouveautés qui se produisent chaque année, il y en a trop qui n'ont aucun mérite. Nous faisons profession de nous les procurer, pour permettre au public de les connaître et pour les étudier nous-mêmes, mais nous ne voulons même pas engager notre responsabilité en reproduisant les éloges qui accompagnent ordinairement leur introduction.

Pour faire connaître au public le résultat de nos études sur les plantes nouvelles, nous publions depuis cinq années un *Annuaire* où sont consignées nos appréciations.

(1) Il ne s'agit ici que des plantes qui se reproduisent par graines et dont nous n'avons *que des graines :* pour les *plantes* vivantes de pleine terre et de serre, les Arbres et Arbustes, les Arbres fruitiers, etc., qui ont pu être jugés chez les horticulteurs ayant leurs établissements dans Paris ou dans les environs, nous reproduisons les renseignements que nous avons pu recueillir.

GRAINES DE FLEURS.

Nous rappelons que le prix des graines de fleurs diverses est de :

100 PAQUETS A NOTRE CHOIX, pour. . . . . 32 fr.
100 PAQUETS AU CHOIX DE L'AMATEUR, pour. . 40

Excepté les paquets cotés 75 centimes et au-dessus, qui se vendent séparément au prix marqué.

⊙ Signifie annuelle, ♂ bisannuelle, ♃ vivace.

1° Plantes que nous avons cultivées et vues fleurir.

fr. c.

ANCOLIE de Sibérie à fleur carnée, ♃, *Renonculacées*. . . . . *le paquet.* » 60

Variété d'un coloris nouveau ; de même que le type, elle a les fleurs dressées et peut être employée pour bordures (1).

ARMERIA formosa carnea, ⊙, ♃, *Plombaginées* . . . . . *le paquet.* » 60

Plante haute d'environ 40 centimètres, intermédiaire pour le port entre l'Armeria plantaginea et le Statice pseudo-armeria. Les feuilles, longues de 10 à 15 centimètres, étalées sur le sol, forment une sorte de rosette irrégulière d'où s'élèvent des tiges nues et déliées. Les fleurs sont réunies en ombelles serrées ou en tête au sommet des tiges ; leur couleur varie du blanc au rose pâle.

CALCÉOLAIRE ligneuse hybride pictée, ♂, *Scrophularinées*. . . . . *le paquet.* 2 50

Graines récoltées sur des variétés de C. rugosa fécondées par des variétés herbacées hybrides. Aussi rustique que les C. ligneuses. Planter en pleine terre en mai ; floraison de mai jusqu'en octobre.

CALCÉOLAIRE sous-ligneuse hybride pictée et maculée, ♂ . . . . . *le paquet.* 2 50

Graines récoltées sur la variété sous-ligneuse *Sultan* fécondée par des variétés herbacées hybrides. Même culture que la précédente ; plantes un peu plus délicates.

Ces fécondations n'ont pas été opérées sous nos yeux ; nous croyons cependant pouvoir recommander ces hybrides d'après les résultats que nous avons vus de fécondations identiques pratiquées par le même horticulteur. Il nous a paru y avoir là un progrès, et nous y avons remarqué des plantes de mérite.

CAPUCINE crystal palace, ⊙, *Tropœolées*. . . . . *le paquet.* » 75

Variété naine, à fleur jaune soufre, avec une macule pourpre sur chaque pétale.

CÉLOSIE à épi pourpre. Celosia pyramidalis purpurea, ⊙, *Amarantacées*. *le paquet.* » 60

Tige droite, forte, haute de 40 à 50 centimètres, à rameaux dressés dont l'ensemble forme une touffe pyramidale. L'extrémité de chaque rameau est transformée en une sorte de panicule ou d'épi conique recouvert de bractées rouge pourpre comme celles de l'Amarante crête. Cette plante, d'un bel effet, rappelle un peu par son aspect le Celosia aurea pyramidalis, dont elle diffère par sa couleur, par ses épis ou panicules plus compactes, et par ses feuilles plus larges.

(1) Les descriptions qui accompagnent ici les plantes nouvelles que nous citons, ne pouvant trouver place sur les catalogues spéciaux où les plantes qui le méritent viendront se classer, nous prions ceux de nos correspondants que ces notes intéressent, de conserver cette édition du *Supplément à nos catalogues*.

fr. c.

CLARKIA pulchella à fleur double, ⊙, *Œnothérées*. . . . . *le paquet.* 1 »

Fleur du Clarkia pulchella à fleur double.

Le Clarkia pulchella a produit, depuis quelques années, de nombreuses variétés intéressantes à divers titres. Parmi ces variétés, celle à fleur double, déjà citée l'an dernier, est remarquable par la duplicature de ses fleurs, composées de plusieurs rangs de pétales qui les rendent si différentes des fleurs simples, qu'on n'y distingue plus la croix de Malte que simulent assez bien les 4 pétales échancrés du C. pulchella.

Cette nouvelle variété sera sans doute recherchée pour sa singularité ; nous donnons ici un croquis des fleurs, qui pourra les faire apprécier ; leur couleur est d'un rose pourpre. Le port ne diffère pas de celui du C. pulchella ; peut-être en massifs produit-elle un peu moins d'effet que ce dernier.

CLARKIA pulchella integripetala alba, ○. . . . . *le paquet.* 1 »

Variété du Clarkia pulchella à fleur blanche, dont les pétales sont entiers au lieu d'être échancrés. Présentant ainsi une surface colorée un peu plus large, les fleurs paraissent plus grandes et produisent peut-être un peu plus d'effet à distance.

COREOPSIS cardaminefolia atrosanguinea, ⊙, *Composées*. . . . . *le paquet.* » 60

Cette nouvelle variété a quelque rapport pour la couleur de ses fleurs avec le Coréopsis élégant marbré ; elle nous paraît devoir lui être préférée pour son port moins élevé, plus compacte, et pour sa floraison au moins aussi abondante.

fr. c.

COREOPSIS Varnieri, ♃. . . . . *le paquet.* » 60

Plante vivace, dont la tige, haute d'environ 50 centimètres, est dressée, très ramifiée, touffue, les feuilles opposées, longues et étroites. Les fleurs, portées par de longs pédoncules, sont grandes, d'un jaune vif, à centre ou disque brun, à rayons profondément dentés.

ENOTHÈRE de Lamarck. OEnothera Lamarckiana, ☉, ♂. *OEnothérées. le paquet.* » 60



Enothère de Lamarck. — Réduite au 10e.

Cette espèce, déjà ancienne, mais qui avait été négligée, mérite de tenir un certain rang parmi les plantes du genre auquel elle appartient. Elle fleurit très bien dès la première année, et a du rapport avec l'Enothère à grande fleur, cependant elle est moins haute et ses fleurs nous paraissent plus grandes et plus nombreuses. La tige, haute de 80 à 90 centimètres, est droite, feuillée, ramifiée vers la base en nombreux et forts rameaux feuillus, étalés, puis redressés vers leur extrémité, et dont l'ensemble occupe une surface de 1m,10 à 1m,20 de diamètre. Les fleurs, larges d'environ 8 centimètres, sont d'un jaune vif, d'un très bel effet, disposées en une sorte d'épi court à l'extrémité de la tige et des rameaux, et s'épanouissent au fur et à mesure que ceux-ci s'allongent, depuis le mois de juin jusque fort tard dans l'automne.

fr. c.

ENOTHÈRE. Œnothera camphylocarpa grandiflora, ⊙. . . . . *le paquet.* » 60

Cette plante nous a paru voisine de l'Œ. versicolor, dont elle diffère par ses dimensions plus fortes. Les fleurs, plus grandes, qui nous ont aussi paru d'un coloris plus vif, doivent la faire préférer ; elles sont d'un vermillon orangé au centre, passant au jaune vif sur les bords.

GIROFLÉE quarantaine jaune soufre à reflet rose, ⊙, *Crucifères. . .* *le paquet.* » 60

— empereur perpétuelle kiris rouge feu, ♂. . . . . — » 60

— empereur perpétuelle kiris pyramidale blanche, ♂. . . . . — » 60

Ces variétés de Giroflées ont été obtenues en Allemagne ; nous les avons déjà citées dans un de nos suppléments précédents, alors qu'elles nous étaient encore inconnues. Maintenant que nous les avons cultivées, nous croyons pouvoir les recommander et nous les adoptons dans nos collections.

IMMORTELLE annuelle pourpre multiflore, ⊙, *Composées . . . . . le paquet.* 1 »

Plante un peu plus basse que l'Immortelle annuelle, à fleurs violettes, plus petites, mais plus nombreuses.

MACHÆRANTHERA tanacetifolia. Aster tanacetifolius, ⊙, ♃ ? *Composées.* *le paquet.* » 60

Machæranthera tanacetifolia. — Réduit au 5e.

Assez jolie petite plante annuelle, d'introduction récente dans les jardins, bien que sa découverte date déjà de plusieurs années. — Sa tige, haute de 20 à 25 centim., est divisée dès la base en rameaux assez nombreux, divergents et dressés ; son feuillage, très découpé et léger, est d'un vert cendré. Ses fleurs, en capitules, assez nombreuses, larges de 4 à 5 centimètres, ont le disque petit, jaune et les rayons longs, d'un lilas violacé ; elles s'épanouissent tout l'été. On peut semer en avril-mai pour obtenir la floraison dans l'année même, mais les semis d'août ou de septembre donneront des plantes plus fortes et plus florifères pour l'année suivante.

MYOSOTIS new large variety. Myosotis palustris à large fleur, ♃, *Borraginées.* *le paquet.* » 60

Nous avons reçu d'Angleterre cette variété, dont la fleur est plus grande que celle du Myosotis palustris, et qui peut, à juste titre, lui être préférée.

fr. c.

ŒILLET. Dianthus barbatus oculatus marginatus, ♂, *Silénées*. . . . . *le paquet.* » 60

Jolie variété de l'Œillet de poëte, à cœur et à bords blancs.

ŒILLET de la Chine lacinié, à fleur blanche, ⊙, *Silénées*. . . . . — 1 »

Cette variété est sortie de l'Œillet de la Chine lacinié, introduit du Japon depuis peu d'années, et dont les fleurs simples sont remarquables par leur ampleur. Les tentatives que l'on a faites pour obtenir des fleurs doubles de cette belle plante n'ont produit que des sujets sans mérite, dont les fleurs se rapprochent de l'Œillet de la Chine double ordinaire. Il faut donc s'en tenir aux variétés à fleurs simples, qui, par la dimension de leurs fleurs, dédommagent du nombre moins grand des pétales.

ŒILLET. Dianthus dentatus, ♃. . . . . *le paquet.* » 60

Petit Œillet à fleur simple rose violacé assez jolie, à rameaux traînants comme ceux de l'Œillet mignardise.

PERSICAIRE du Levant naine. Polygonum orientale pumilum, ⊙, *Polygonées. le paquet.* » 60

Bonne variété, haute de 60 à 70 centimètres, récemment introduite d'Allemagne.

La Persicaire du Levant est une plante des plus ornementales; ses fleurs en longues grappes pendantes lui donnent un aspect très pittoresque, mais, à cause de sa taille élevée, elle ne convient que pour de grands jardins. — La variété naine est recommandable en ce qu'elle permet l'emploi de cette plante dans les petits jardins. Ses fleurs sont de la même nuance rose, et forment des grappes aussi longues que le type. Le port des plantes nous a paru aussi un peu plus compacte.

PIED-D'ALOUETTE vivace à grande fleur blanche, ♃, *Renonculacées. le paquet.* » 60

Variété nouvelle par la couleur de ses fleurs.

REINE-MARGUERITE imbriquée pompon demi-naine, rose, ⊙, *Composées. le paquet.* 1 »

— imbriquée pompon demi-naine, gris de lin, ⊙. . . . . — 1 »

Les variétés demi-naines de Reines-Marguerites trouvent leur emploi dans beaucoup de circonstances dans lesquelles les variétés élevées ne conviendraient pas; aussi offrent-elles un certain intérêt. Les deux variétés ci-dessus sont les seules que possède la classe des Reines-Marguerites pompons; on sait que les caractères de cette classe sont la forme de leurs fleurs (d'où leur vient la désignation de pompon), leur bonne tenue, et leur abondante floraison.

REINE-MARGUERITE pyramidale demi-anémone, couleur de chair, ⊙. *le paquet.* 80

Bonne variété nouvelle, d'une belle tenue et florifère.

REINE-MARGUERITE pyramidale demi-naine, à bouquet lilas, ⊙. . . *le paquet.* 1 »

Variété nouvelle ayant de l'analogie avec celle dite demi-naine blanche à bouquet, l'une des plus jolies variétés de Reines-Marguerites.

REINE-MARGUERITE chrysanthème naine, blanche, ⊙. . . . . *le paquet.* 1 »

Nous avions déjà annoncé cette variété l'an dernier, parmi les plantes qui nous étaient inconnues; aujourd'hui nous pouvons la recommander comme une bonne variété.

REINE-MARGUERITE géante empereur (*Riesen Kaiser*), ⊙.

— lilas rougeâtre. . . . . *le paquet.* 1 »

— fleur de Pêcher. . . . . — 1 »

— blanche. . . . . — 1 »

— rose. . . . . — 1 »

— bleu clair . . . . . — 1 »

fr. c.

REINE-MARGUERITE géante empereur mauve. . . . . *le paquet.* 1 »

— violet clair. . . . . — 1 »

Ces variétés, introduites d'Allemagne, sont les meilleures de la section des *Riesen Kaiser* que nous ayons rencontrées dans une collection nombreuse que nous avons essayée ; leurs caractères sont les mêmes que ceux des variétés déjà connues : des fleurs énormes et peu nombreuses, portées sur des tiges fortes et roides.

REINE-MARGUERITE à aiguilles, pompon rouge, ⊙ . . . . . *le paquet.* 1 »

Cette nouvelle variété d'un genre de Reines-Marguerites curieuses par leurs pétales roulés et soudés en forme d'aiguilles, diffère des anciennes par ses fleurs plus petites, globuleuses et plus nombreuses.

RHODANTHE Manglesii maculata, *Composées*. . . . . *le paquet.* 2 »

Fleur du Rhodanthe Manglesii maculata.

Bien que nous n'ayons pas encore cultivé cette plante, nous croyons pouvoir la recommander d'après ce que nous en avons vu ; son introducteur, M. Thompson d'Ipswich, qui en a reçu les graines d'Australie, nous ayant envoyé un échantillon des fleurs dont nous donnons le croquis ci-joint. Ces fleurs se distinguent par leur grandeur et par la tache pourpre qui occupe la base des pétales ou rayons, formant une sorte d'auréole autour du disque ; elles sont scarieuses comme celles du type, ce qui permet de les conserver longtemps coupées comme les Immortelles. Le Rhodanthe maculata paraît donner des plantes plus fortes que le Rhodanthe Man-

fr. c.

glesii; si ces plantes sont aussi florifères, cette variété sera une des plus jolies acquisitions pour la culture en pots parmi les plantes annuelles.

Nous rappelons que les Rhodanthe demandent à être cultivés en terre de bruyère.

RUDBECKIA de Neumann. Rudbeckia Neumanni, ♃, *Composées* . . . *le paquet.* » 60

Tige haute de 70 à 80 centimètres, grosse, ramifiée à la partie supérieure, à grandes feuilles pennées, à folioles ovales-lancéolées. Fleurs grandes, jaunes, à centre brun.

SENEÇON nain à fleur violette double, ⊙, *Composées* . . . . . *le paquet.* » 60

Les variétés du Seneçon double sont d'excellentes plantes pour les massifs, les corbeilles et les plates-bandes. Leur floraison abondante et prolongée, leurs jolies fleurs en forme de petits pompons, leur port compacte, leur feuillage même assez régulièrement découpé, sont autant de mérites qui doivent leur assurer une place dans nos jardins.

La variété nouvelle que nous annonçons ici a de plus l'avantage d'être naine; elle ne dépasse pas 25 à 30 centimètres de hauteur, ce qui permet de l'utiliser en bordures, emploi que ne peuvent avoir les variétés plus grandes : à ce titre, elle est précieuse; ses fleurs sont aussi grandes, sa floraison aussi abondante et aussi durable que celle des autres variétés.

SENEÇON double Magenta, ⊙. . . . . *le paquet.* » 60

Jolie variété nouvelle à fleur violet rosé, reçue d'Allemagne et déjà citée l'an dernier. Elle ne diffère pas, pour son port et pour la durée de sa floraison, des autres variétés de Seneçon double.

SOLANUM Gilo à tiges vertes, ⊙, *Solanées.* . . . . . *le paquet.* » 60

— Gilo à tiges violettes, ⊙. . . . . — » 60

Ces deux plantes ne diffèrent entre elles que par la couleur de leurs tiges, lesquelles s'élèvent à environ 1 mètre et sont un peu épineuses. Leur feuillage rappelle celui de l'Aubergine à fruit écarlate. Leur fleur blanche, petite, présente peu d'intérêt; mais le fruit, d'un rouge éclatant, est assez ornemental : par sa forme de Tomate, il ressemble au fruit du Solanum Texanum, mais il en diffère par sa petitesse et par sa maturité plus hâtive.

SOLEIL à une fleur. Helianthus uniflorus, ○, *Composées.* . . . . . *le paquet.* » 40

Le principal mérite du Soleil annuel est dans la grandeur de ses fleurs, qui sont certainement les plus volumineuses de toutes les fleurs de pleine terre. A ce point de vue, le Soleil à une fleur est des plus curieux par la grosseur énorme de ses fleurs, qui dépassent de beaucoup celles du Soleil ordinaire et mesurent souvent jusqu'à 40 centimètres de diamètre. Il est vrai que ces fleurs sont très peu nombreuses, puisqu'il ne s'en trouve ordinairement qu'une seule par pied. Les plantes prennent aussi un développement en hauteur proportionné à la grandeur des fleurs; les feuilles sont très larges, et la tige atteint jusqu'à 3 mètres et plus.

SOLEIL à centre vert. ○, *Composées.* . . . . . *le paquet.* » 80

Cette variété, que nous cultivons depuis quelques années, nous avait d'abord paru identique avec le Soleil de Californie (*Annuaire* 1860), chez lequel se produisent accidentellement des fleurs vertes au centre. Nous avons reconnu depuis que c'est une variété distincte, dont la fleur, au moins aussi large que celle du Soleil double, a constamment un centre assez large, d'un vert gai et d'assez bon effet.

SOLEIL. Helianthus argophyllus striatiflorus, fl. pleno, ⊙. . . . . *le paquet.* 1 »

Variété du Soleil du Texas, dont les fleurs, très doubles et plus nombreuses, ont les pétales très finement bordés de brun. Les plantes s'élèvent à $1^{m},50$ ou 2 mètres, et ont les tiges et les feuilles cotonneuses blanchâtres comme dans le type.

fr. c.

TAGETES à taches pourpres nain. Tagetes signata pumila (*Vilmorin*), ⊙, *Composées* . . . . . *le paquet.* 1 »

Fleur du Tagetes à taches pourpres nain.

Cette nouvelle variété, que nous avons obtenue dans un semis de Tagetes signata, diffère de ce dernier par sa taille moins élevée, par son port et par l'abondance de sa floraison. Elle forme une touffe très compacte, une sorte de buisson touffu haut de 30 à 35 centimètres, large de 50 à 60 et même plus, qui est littéralement couvert de fleurs pendant toute la belle saison, c'est-à-dire depuis juin jusqu'à l'approche des gelées. Ses fleurs, larges d'environ 3 centimètres, sont d'un jaune vif nuancé et strié orange à la base de chaque pétale. Le feuillage, d'un vert gai, est extrêmement découpé, et ajoute par sa finesse à la beauté de la plante.

Touffe de Tagetes à taches pourpres nain. — Réduite au 10e.

Cette variété est des plus convenables pour les massifs : quelques pieds suffisent pour former une corbeille ; pour bordures ou pour plates-bandes, elle est égale-

fr. c.

ment recommandable. Elle devra produire un bon effet, associée à d'autres plantes de couleurs vives, comme le Geranium rouge Tom Pouce, par exemple.

La culture est des plus simples : semer en pleine terre en pépinière, en avril-mai, en terre légère bien amendée.

ZINNIA élégant à fleur double écarlate, ⊙, *Composées*. . . . . *le paquet.* 1 »

Zinnia élégant à fleur double. — Réduit au 8e.

Le Zinnia à fleur double est sans contredit l'introduction la plus importante qui ait été faite récemment parmi les plantes annuelles. — Chaque année la culture tend à l'améliorer ; les graines produisent déjà un moins grand nombre de plantes à fleurs simples. Dans les semis, on trouve des nuances très variées, parmi lesquelles on remarque des tons d'une grande fraîcheur. On peut espérer qu'on parviendra à fixer ces nuances, et que dans quelques années on pourra faire des collections de Zinnia double par couleurs, comme on en fait de Reine-Marguerite et de Giroflée.

La variété écarlate que nous annonçons s'est sans doute aussi produite ailleurs que dans nos semis ; nous nous sommes appliqués, depuis deux ans que nous l'avons rencontrée, à l'épurer ; cependant les fleurs peuvent varier encore du cuivré à l'orange.

fr. c.

ZINNIA du Mexique. Zinnia Ghiesbreghtii, ⊙ . . . . . *le paquet.* 1 »

Zinnia du Mexique.

Belle espèce nouvelle et intéressante, introduite depuis deux ans. — Ses tiges se divisent dès leur base en ramifications nombreuses et traînantes, dressées à leur extrémité, formant une touffe assez serrée haute de 35 à 40 centimètres. Les feuilles sont allongées, lancéolées, beaucoup plus étroites que celles du Zinnia élégant et souvent pliées dans le sens de leur longueur. Ses fleurs naissent à l'extrémité des ramifications et de leurs subdivisions ; elles sont larges de 4 à 5 centimètres, composées de sept ou huit pétales larges, striés, un peu recourbés, d'un jaune vif nuancé orange, entourant un disque peu proéminent d'un brun noir. Ces fleurs, très nombreuses, rappellent par leur forme un Œillet d'Inde simple ; elles sont d'un bel effet par la vivacité de leur couleur, et se succèdent sans interruption depuis juin jusqu'aux gelées.

Le Zinnia du Mexique est plus florifère que le Z. élégant : par son port peu élevé et compacte, il convient parfaitement à la formation de corbeilles ou de massifs destinés à rester tels toute la durée de la belle saison. Nous le considérons comme une nouveauté intéressante et remarquable, au point de vue de l'amélioration et des variétés qu'on entrevoit la possibilité d'en obtenir.

Sa culture consiste à semer en avril-mai en pépinière, à repiquer les plants en pépinière pour les mettre en place un peu avant la floraison. On peut aussi semer sous châssis et sur couche en mars-avril, et repiquer les plants sous châssis.

2° Plantes que nous n'avons ni cultivées ni vues fleurir.

Depuis longtemps nous nous sommes fait un devoir de mettre à la disposition de nos clients des graines de toutes les plantes nouvelles (annuelles et vivaces de pleine terre) qui se produisent chaque année sur les catalogues avec des descriptions plus ou moins pompeuses. En les annonçant sur les éditions précédentes du *Supplément à nos catalogues*, nous avons cherché à prémunir le public contre les déceptions qui pourraient résulter des annonces que nous avions cru devoir reproduire textuellement, en réservant notre responsabilité pour toutes les plantes que nous n'avions pas cultivées nous-mêmes. Cependant ces réserves, que nous avions exprimées le plus clairement possible, n'ont pas toujours été bien comprises, et l'on nous a imputé des éloges souvent exagérés que nous nous étions pourtant contentés de transcrire ou de traduire en les accompagnant de guillemets. Nous croyons donc devoir supprimer les descriptions, que l'on trouvera, l'année prochaine, sur ce *Supplément* pour les plantes que nous aurons adoptées, ou dans notre *Annuaire* pour celles dont le mérite ne nous aura pas paru suffisant pour les faire entrer dans nos collections.

		fr. c.
Abobra viridiflora, ♃, *Cucurbitacées*	10 *graines.*	1 50
Agrostis æmula, ☉, *Graminées*	*le paquet.*	» 60
Amarantus melancolicus ruber, ☉, *Amarantacées*	—	2 »
— speciosissimus, ☉	—	» 60
Anagallis grandiflora sanguinea, ☉, ♃, *Primulacées*	—	» 75
— grandiflora Garibaldi, ☉, ♃	—	» 75
Ancolie. Aquilegia californica gigantea, ♃, *Renonculacées*	—	1 »
— Aquilegia canadensis rosea gigantea, ♃	—	1 50
— Aquilegia caryophylloides, ♃	—	» 60
— Aquilegia Skinneri elatior splendens, ♃	—	» 60
Arctotis grandiflora argentea, *Composées*	—	» 60
Argemone grandiflora lutea, ○, *Papavéracées*	—	» 60
Aster amellus elegans, ♃, *Composées*	—	1 50
Benoite. Geum coccineum macrophyllum, ♃, *Rosacées*	—	» 60
— Geum coccineum superbum, ♃	—	» 60
Blyttia pendula, ○, *Graminées*	—	» 60
Campanula Leutweinii, ♃, *Campanulacées*	—	1 »
Capucine hybride de Lobb géant des batailles, ☉, *Tropæolées*	—	1 »
— hybride de Lobb glory, ☉	—	2 »
Celosia new crimson feathered, ○, *Amarantacées*	—	» 60
Chænostoma fastigiatum à fleur blanche, ☉, *Scrophularinées*	—	» 75
Clarkia pulchella carnea, ☉, *Œnothérées*	—	1 »
— pulchella fimbriata, ☉	—	» 60
— pulchella caryophylloides, ☉	—	» 60
— pulchella integripetala nana, ☉	—	2 50
— pulchella integripetala undulata, ☉	—	» 60
Coix exaltata, ☉, *Graminées*	—	» 60
Collinsia grandiflora alba, ☉, *Scrophularinées*	—	1 »
Courge rouge de Crimée, ○, *Cucurbitacées*	—	» 60
Cuphea purpurea atropurpurea, ☉, ♃, *Lythrariées*	—	» 60
— Zimapani, ☉, ♃	—	1 »
Datura chlorantha, ☉, *Solanées*	—	» 60
Digitalis purpurea gloxiniæflora, ♃, *Scrophularinées*	—	1 »

		fr.	c.
Dolichos	Lablab atrosanguineus, ⊙, *Papilionacées* . . . . . *le paquet.*	»	75
Enothère.	OEnothera biennis alba, *OEnothérées*. . . . . —	»	60
—	OEnothera micrantha . . . . . —	»	60
—	OEnothera missouriensis. . . . . —	»	60
—	OEnothera undulata alba. . . . . —	»	60
Eragrostis	siphrosanthes, ⊙, *Graminées*. . . . . —	1	50
Fiornia	pulchella, *Graminées*. . . . . —	»	60
Gaillardia	hybrida grandiflora, ♃, *Composées*. . . . . —	»	60
Giroflée	quarantaine rouge sang (*blutroth*), ⊙, *Crucifères*. . . . . —	2	»
—	quarantaine naine à bouquet, cramoisie, ○ . . . . . —	1	»
—	quarantaine à grande fleur jaune canari, ⊙. . . . . —	1	»
—	empereur perpétuelle grecque, cramoisi foncé, ♂ . . . . . —	1	»
—	cocardeau rose vif. Neue Cocardeau-Levkoyen hoch rosa ♂. . . . . —	1	»
Godetia	the Bride, ⊙, *OEnothérées*. . . . . —	2	50
Héliotrope	Napoléon, ⊙, ♃, *Borraginées*. . . . . —	»	60
Isolepis	panormitana, *Cypéracées*. . . . . —	1	»
—	Parlatoris. . . . . —	1	»
Leptochloa	Schimperiana, *Graminées* . . . . . —	1	»
Linaria	bipartita sulphurea, ⊙, *Scrophularinées*. . . . . —	»	60
—	new yellow, ⊙ . . . . . —	»	60
Linum	flavum, ♃, *Linées*. . . . . —	»	60
—	narbonense, ♃ . . . . . —	»	60
—	luteum corymbiflorum, ♃. . . . . —	»	60
Lobelia	Erinus compacta alba, ⊙, *Lobéliacées*. . . . . —	1	»
—	speciosa kermesina, ⊙. . . . . —	1	»
Lupinus	Hartwegii ruber, ♃, *Papilionacées*. . . . . —	1	»
—	hybridus nigrescens, ⊙. . . . . —	1	50
Lychnis	lapponica, ♃, *Silénées*. . . . . —	»	75
Medicago	littoralis, ⊙, ♃, *Papilionacées*. . . . . —	»	75
Mesembrianthemum	Decandolleanum, ⊙, *Mésembrianthémées*. . . . . —	»	60
Micropus	supinus, ⊙, *Composées*. . . . . —	»	60
Mimulus	cupreus, ⊙, *Scrophularinées*. . . . . —	3	»
—	roseus pallidus fl. albo, ⊙ . . . . . —	1	»
Muflier	Prince impérial, ⊙, ♃, *Scrophularinées*. . . . . —	»	75
Nemophila	discoidalis elegans, ○, *Hydrophyllées* . . . . . —	1	»
—	discoidalis vittata, ⊙. . . . . —	1	»
Nolana	atriplicifolia subcœrulea, ⊙, *Nolanées* . . . . . —	1	»
Œillet	de la Chine. D. sinensis fl. cupreo nigro pleno, ⊙, *Silénées*. . . . —	»	60
—	Dianthus hybridus atropurpureus . . . . . —	»	60
Onobrychis	supina, ♃, *Papilionacées*. . . . . —	»	60
Pennisetum	fimbriatum, *Graminées*. . . . . —	»	75
Pervenche	de Madagascar à fleur blanche sans œil rose, ⊙, ♃, *Apocynées*. —	»	75
Phlox	de Drummond Magenta, ⊙, ♃, *Polémoniacées* . . . . . —	»	60
—	Mars, ⊙, ♃ . . . . . —	»	60
—	variabilis, ⊙, ♃ . . . . . —	»	75
Poa	tortilis, ⊙, ♃, *Graminées*. . . . . —	»	75
Poppia	Fabiana, ⊙, *Cucurbitacées*. . . . . —	1	»

		fr.	c.
POURPIER à grande fleur double, ⊙, ♃, *Portulacées*.	*le paquet.*	2	50
— à grande fleur, panaché jaune et orange, ⊙, ♃.	—	»	75
REINE-MARGUERITE pivoine à fleu .anche, ⊙, *Composées*. . . .	—	1	»
— pivoine demi-naine, fleur de pommier (apfelblüthe), ⊙.	—	1	»
— chrysanthème naine, couleur de chair (fleischfarbe), ⊙.	—	1	50
— chrysanthème naine blanc de neige (schneeweiss), ⊙.	—	1	50
— naine turban. Neue Zwerg Turban-Aster, ⊙	—	1	»
— Victoria rose carmin. Victoria-Aster carmin rosa, ⊙	—	2	»
— Victoria violet foncé. Victoria-Aster dunkelviolet, ⊙.	—	2	»
RICIN du Brésil. R. brasiliensis, ⊙, ♃, *Euphorbiacées*.	—	»	60
— de Bourbon. R. borboniensis, ⊙, ♃.	—	1	»
— des Philippines. R. species, ⊙, ♃.	—	1	»
— sanguin nain. R. sanguineus minor, ⊙, ♃.	—	»	75
SALVIA pendula, ♃, *Labiées*.	—	1	»
— coccinea stricta, ⊙.	—	1	»
SAPONARIA calabrica marginata, ⊙, *Silénées*.	—	1	50
SAUSSURA pulchella, ♃, *Composées*.	—	»	60
SOLANUM hystrix, ♂, *Solanées*.	—	»	60
SOLEIL. Helianthus macrophyllus giganteus, ⊙, *Composées*.	—	1	»
SOUCI. Calendula officinalis superba, ⊙, *Composées*.	—	»	60
— Calendula officinalis sulphurea, ⊙.	—	»	75
STATICE Fortunei, ♃, *Plombaginées*.	—	»	75
— Texana, ♃	—	»	60
— sinuata hybrida, ♃.	—	»	60
STEVIA ovata, ♃, *Composées*.	—	»	60
TAGETES patula nana stricta, ⊙, *Composées*	—	»	60
— tenuifolia, ⊙	—	»	60
THLASPI. Iberis Garrexiana, ⊙, ♃, *Crucifères*.	—	»	60
THUNBERGIA americana, ⊙, ♃, *Acanthacées*.	—	»	60
— mesoleuca, ○, ♃.	—	»	60
VICIA Gerardii, ⊙, *Papilionacées*	—	»	60

GRAINES DE PLANTES POTAGÈRES.

1° Plantes potagères que nous avons cultivées.

CAROTTE rouge demi-longue nantaise. . . . . *les 30 grammes.* » 40

Très belle racine de forme presque cylindrique, terminée abruptement comme celle de la Carotte courte ; elle est plus grosse et plus longue que celle-ci et paraît devoir être une acquisition d'un certain mérite pour le jardin potager.

HARICOT d'Alger nain à grain noir. . . . . *le demi-litre.* 1 50

Variété du Haricot d'Alger, franchement naine et à grain un peu plus petit. Elle est aussi hâtive que le H. beurre blanc nain, mais elle nous a paru un peu plus productive ; comme toutes les variétés du H. beurre, sa cosse, de couleur beurre frais, est sans parchemin et peut être consommée jusqu'au moment où les graines sont arrivées à maturité.

HARICOT comte de Vougy. . . . . *le demi-litre.* 1 50

Cette variété, cultivée dans le département de la Loire et probablement aussi

fr. c.

ailleurs, est remarquable par son énorme production comme Haricot vert, mais elle a le défaut de mûrir difficilement ses graines ; elle est sans parchemin ; le grain en est petit, allongé, un peu aplati, d'une couleur brun verdâtre ardoisé et comme enfumé.

HARICOT nain blanc de l'île de la Réunion. . . . . *le demi-litre.* 1 50

Variété sans parchemin, un peu élevée pour un H. nain, produisant beaucoup, mais mûrissant difficilement son grain. Celui-ci est blanc, petit, de forme oblongue.

POMME DE TERRE Caillaud. . . . . *le litre*, 20 centimes, *le décalitre.* 1 80

Tubercule très gros, jaune, ayant les yeux assez enfoncés ; à chair fine et ferme. Cette variété, un peu moins hâtive que la P. de terre Shaw, nous a paru plus productive dans la proportion d'un sixième.

POMME DE TERRE Dalmahoy. . . . . *le litre.* » 50

Cette variété nous avait paru voisine de la Pomme de terre jaune ronde hâtive, mais moins productive qu'elle, ainsi que nous l'avons relaté dans l'*Annuaire de nos essais* de 1860. Cependant comme dans d'autres cultures en France elle paraît avoir donné de bons résultats, et que d'ailleurs elle est estimée en Angleterre pour ses qualités comme Pomme de terre de table et pour sa fertilité, nous croyons pouvoir la recommander. Le tubercule est de grosseur moyenne, arrondi, jaune, à chair blanche très farineuse et à peau très rugueuse. Maturité demi-hâtive.

POMME DE TERRE Fluke's kidney. . . . . *le litre.* » 50

Tubercule de grosseur moyenne, jaune, demi-allongé, déprimé ; yeux très rares, peu enfoncés ; chair blanc jaunâtre. Nous avons déjà essayé en 1855 cette variété que nous avions reçue d'Angleterre, mais comme elle ne nous avait rien présenté de saillant, nous l'avions abandonnée sans la faire figurer sur nos catalogues. Ce qui nous engage à l'annoncer maintenant, c'est qu'elle a été adoptée dans les cultures des environs de Dunkerque, où elle est estimée pour ses bonnes qualités et sa fécondité.

2° Plantes que nous n'avons pas cultivées.

CHOU. Beck's new premier Cabbage (Ch. nouveau très hâtif de Beck). *le paquet.* » 50
— Fearnought . . . . . — 1 »
— Harrison's Victoria Cabbage (Ch. Victoria de Harrison). . . . . — » 50
— Higham . . . . . — » 50
— Nelson's Defiance Cabbage . . . . . — » 50
— New feather stem Savoy (Chou de Milan à tige feuillée) . . . . . — » 50
— Non such Cabbage. . . . . — » 50
— Pontefract. . . . . — » 50
— Robinson's Champion Drumhead ox Cabbage . . . . . 10 *grammes.* 1 »
— Shakespeare early dwarf Cabbage . . . . . *le paquet.* » 50
— Weseler weisser Kopfkohl (Ch. pommé blanc de Wesel) . . . . . — » 50
— BROCOLI Davy's incomparable. . . . . — » 60
— BROCOLI Foster's Champion of England. . . . . — » 60
CONCOMBRE de Babylone. . . . . — » 60
— de Schermetschiah . . . . . — » 60
— Schneeweisse ganz glatte Riesen-Schlangen Gurken. . . . . — » 60
CUCUMIS MELO serotinus. . . . . — » 60
FÈVE. Beck's new dwarf green gem Bean (F. naine verte nouvelle de Beck). *demi-litre.* 1 »

		fr.	c.
Fève Harrison's emperor Bean (F. empereur de Harrison), ...	*demi-litre.*	»	75
Laitue. Dixon's Essex Champion Lettuce.	*le paquet.*	»	50
— Kopfsalat grosser grüner von Grosswardein (L. grosse verte de Grosswardein)	—	»	50
Romaine. Carter's giant brown Cos Lettuce	—	1	»
— Carter's giant brown Cos Lettuce	—	1	»
— Dunnett's giant black seeded brown Cos Lettuce.	—	1	»
— Moorpark Cos Lettuce.	—	»	50
Melon Davy's neue Bastard (M. hybride nouveau de Davy).	—	1	»
— de Yermela.	—	1	»
Navet. Hertfordshire white round Turnip 30	*grammes.*	1	»
Oseille. Grosser Riesen Sauerampfer (Oseille géante)	*le paquet.*	»	50
Pois. Evergreen Surrey Pea.	—	1	»
— Harrison's new early gem Pea.	—	1	»
— Prince of Wales Pea.	—	1	»
Rutabaga. Harrison's golden globe Swedish Turnip. 30	*grammes.*	»	50
— Improved bronze top Swedish Turnip	—	»	50

GRAINES DE PLANTES FOURRAGÈRES ET INDUSTRIELLES.

Glaucium flavum. Glaucie jaune, *Papavéracées.* . . . . . *les* 30 *grammes.* 2 »

Plante oléagineuse vivace étudiée par M. Cloëz, répétiteur de chimie à l'École polytechnique, et proposée par lui pour utiliser certains terrains incultes où son introduction serait avantageuse au point de vue du rendement et de la qualité du produit. Elle croît spontanément dans les sables des dunes, et vient très bien dans des terrains légers de mauvaise qualité, pourvu qu'ils soient sains. Les résultats obtenus dans des sols de cette nature ont été des plus satisfaisants. On peut en recueillir 17 à 20 hectolitres de graines par hectare, qui peuvent rendre jusqu'à 42 pour 100 d'huile d'un bon goût, comparable à l'huile d'Œillette ou de Pavot.

Pour la récolte, les tiges doivent être cueillies lorsque les premières gousses s'entr'ouvrent, les autres mûrissent en partie en quelques jours.

Glaucium phœniceum. Glaucie rouge. . . . . *les* 30 *grammes.* 3 »

Espèce annuelle également proposée par M. Cloëz pour le même usage que la précédente. La récolte des graines en est plus facile, elle offre moins de déperdition par l'égrenage; aussi le produit en est-il plus élevé. M. Cloëz calcule qu'on en peut obtenir jusqu'à 30 hectolitres par hectare, mais que ces graines ne rendent que 28 à 30 pour 100 d'huile d'une aussi bonne qualité que la précédente. Le résidu de la pression serait un excellent engrais, et pourrait peut-être aussi servir à la nourriture des bestiaux.

Le semis de la Glaucie rouge paraît devoir être fait à l'automne; les semis du printemps n'ont pas donné d'aussi bons résultats dans les essais. C'est une plante des terrains essentiellement sablonneux ; il sera bon de l'essayer également dans des sols de nature différente.

Millet bicolore. Sorghum bicolor. . . . . *le kilogramme.* 1 »

Cette variété, que nous avons reçue d'Angleterre, a le grain légèrement plus allongé que le Millet noir et d'une couleur grise. Depuis deux ans que nous la cultivons, elle nous a paru plus haute, plus vigoureuse et plus hâtive que le Millet noir ; celui-ci ne montrait encore que quelques panicules lorsque celles du Millet bicolore étaient déjà presque complétement développées.

fr. c.

ZIZANIA aquatica. Zizanie aquatique. Riz sauvage. . . . . *le paquet.* 1 »

Le Zizania aquatica est une plante spontanée des terrains marécageux et des bords des rivières de l'Amérique du Nord. Il sera intéressant et peut-être avantageux d'en introduire la culture en France au point de vue d'utiliser les terrains analogues à ceux cités plus haut. Sa végétation, qui s'avance jusque dans le Canada, permet d'espérer que notre climat ne lui sera pas défavorable. Les tiges du Zizania paraissent être un excellent fourrage ; ses graines ont un peu la forme des graines d'Avoine, mais elles sont beaucoup plus allongées, barbues et coriaces ; il paraît cependant qu'elles entrent dans l'alimentation des peuplades indiennes qui les connaissent sous le nom de *Canadian Rice ;* l'analyse a démontré que ces graines contiennent beaucoup de principes nutritifs qui pourraient leur donner une certaine valeur.

FRAISIERS.

☞ Nous transcrivons les renseignements qui nous ont été communiqués par nos correspondants.

Blanche d'Orléans (*Vigneron*) . . . . . *le pied.* 1 25
les 5 pieds. 5 50

Variété du Fraisier des Quatre saisons, à fruit blanc, plus gros et plus abondant que dans le type.

British Sovereign (*Stewart* et *Neilson*) . . . . . *le pied.* 2 25
les 5 pieds. 10 »

Variété vigoureuse, très fertile et à gros fruit.

Cornucopia (*Nicholson*) . . . . . *le pied.* 1 50
les 10 pieds. 12 »

Fruit gros en forme de cœur, rouge vif glacé ; graines saillantes ; chair rose, juteuse, sucrée, relevée ; plante très rustique et excessivement fertile. Maturité moyenne.

Crimson Cluster (*Mme Clements*) . . . . . *le pied.* 1 50
les 5 pieds. 7 »

Fruit moyen ou gros, de forme ronde, quelquefois en crête de coq, rouge pourpre ; chair rouge, pleine, juteuse, sucrée, avec une saveur de cerise très prononcée ; plante rustique et fertile, produisant pendant longtemps.

Culverwell's sans pareil. . . . . *le pied.* 1 50
les 5 pieds. 7 »

Fruit gros, de forme allongée, quelquefois difforme, couleur rouge vif luisant ; graines enfoncées dans les alvéoles ; chair ferme, blanche, rouge vers l'extérieur, juteuse, sucrée, très parfumée. Maturité tardive.

Eclipse (*Reeve*) . . . . . *le pied.* 1 50
les 10 pieds. 12 »

Fruit gros, de forme ronde ou ovale, rouge vif ; graines saillantes ; chair blanc rosé, pleine, sucrée, très parfumée. Variété très vigoureuse, hâtive et fertile.

Exposition de Châlons (*Dr Nicaise*) . . . . . *le pied.* 2 25
les 5 pieds. 10 »

Fruit gros ou très gros, de forme ovale ou aplatie, rouge pourpre brillant ; graines nombreuses, saillantes ; chair rose veinée de rouge, juteuse, sucrée,

fr. c.

particulièrement parfumée. Le fruit se conserve longtemps en bon état sur pied, ce qui, avec ses autres qualités, fera rechercher cette variété. Maturité moyenne.

Grand'mère de Bollwiller (*Baumann*). . . . . *le pied.* 1 50
les 5 pieds. 7 »

Fruit très gros, de forme arrondie, rouge vif ; chair rose, pleine, juteuse, sucrée. Variété rustique et fertile. Très recommandée.

Great Eastern (*Stewart* et *Neilson*) . . . . . *le pied.* 2 25
les 5 pieds. 10 »

Plante vigoureuse, fertile et à gros fruit.

King Arthur (*M^me^ Clements*). . . . . *le pied.* 1 50
les 5 pieds. 7 »

Fruit gros ou très gros, de forme conique ou aplatie, rouge vif luisant ; graines saillantes ; chair rose, pleine, juteuse, sucrée, agréablement parfumée. Variété tardive, très fertile et rustique.

Lord Murrey (*Stewart* et *Neilson*). . . . . *le pied.* 2 25
les 5 pieds. 10 »

Plante vigoureuse, fertile et à gros fruit.

Newton seedling (*Challoner*). . . . . *le pied.* 1 50
les 5 pieds. 7 »

Fruit gros, de forme conique, rouge vif brillant ; graines jaunes peu enfoncées dans les alvéoles ; chair blanc rosé, juteuse, relevée ; maturité demi-hâtive. Bonne variété.

Des bois à fleur double. . . . . *les 6 pieds.* 6 »

Variété très ancienne qui avait été délaissée. Elle nous paraît plutôt curieuse et intéressante pour les collectionneurs qu'utile. Ses fleurs, petites, doubles, se succèdent pendant longtemps et donnent naissance à des fruits ayant le goût de la Fraise des bois.

ARBRES FRUITIERS.

PÊCHE verte de Beaulieu . . . . . *nains.* 2 75

Originaire du département du Gers. Le cultivateur qui l'a obtenue la présente comme une variété tardive dont le fruit est gros et de première qualité.

POIRIER Anna Audusson. . . . . *pyramides.* 2 »

Arbre vigoureux et fertile. Fruit assez gros, turbiné, vert clair ; chair fondante, de bonne qualité. Maturité : novembre à janvier.

POIRIER Beurré Dumon . . . . . *pyramides.* 1 50

Cette variété n'est pas nouvelle, mais elle est peu connue, quoique très recommandable, et nous l'annonçons pour la première fois. Le fruit ressemble à celui du Poirier délices d'Hardempont, mais la qualité en est réellement supérieure ; il mûrit un peu plus tôt. Arbre très vigoureux et rustique.

POIRIER Beurré Luizet. . . . . *pyramides.* 3 50

Arbre de vigueur moyenne. Fruit gros ou très gros ; chair demi-fine, blanche, passablement parfumée, contenant une eau abondante très sucrée. Maturité : novembre à janvier.

fr. c.

POIRIER Besi-mai. 3 50



Poire Besi-mai.

Obtenue par M. de Jonghe. Le nom de Besi-mai lui a été donné de la forme de ses fruits et de leur époque de maturité. Cette variété vigoureuse, fertile et rustique, se recommande aussi par la qualité de ses fruits. Ceux-ci, dont nous donnons une silhouette, sont d'un vert fauve pointillé de brun au moment de la cueillette, et d'un vert plus pâle jaunissant vers le pédoncule à la maturité. La chair, d'une contexture beurrée, est serrée et ferme ; le jus, assez abondant, est sucré et d'une saveur relevée. Ces fruits sont d'une conservation facile et mûrissent en mai. Les formes préférables pour la culture de cette variété sont la pyramide et la basse tige : en haute tige, les fruits ont l'inconvénient de tomber par les vents un peu forts. On peut aussi la cultiver avec succès en espalier.

fr. c.

POIRIER Duchesse d'hiver ou Tardive de Toulouse. . . . . *pyramides.* 2 75



Poire Duchesse d'hiver.

Arbre vigoureux et fertile, propre à être cultivé sous toutes formes et réussissant également bien greffé sur franc ou sur cognassier. Fruit gros, comme on peut en juger par la silhouette que nous en donnons d'après un dessin de la *Revue horticole*, bosselé; à peau grenue, vert clair devenant jaunâtre à la maturité, parsemée de points fauves et colorée orange clair du côté du soleil. La chair est blanche, assez fine, fondante et sucrée, même avant l'époque de la maturité, qui a lieu de décembre à avril. Les fruits sont d'une conservation facile.

fr. c.

POIRIER général Totleben. . . . . *pyramides.* 2 »

Poire général Totleben.

Arbre de vigueur moyenne, très fertile. Le fruit, dont nous donnons un croquis d'après l'*Illustration horticole*, est pyriforme, jaune tacheté et pointillé de brun à

fr. c.

la maturité ; la chair en est rosée, très fondante, parfumée et imprégnée d'une eau abondante très sucrée. La maturité a lieu de décembre à février ; dans les bons fruitiers, on peut conserver les fruits jusqu'en mars.

Il est préférable de cultiver cette variété en pyramide ; elle vient bien aussi en espalier : la haute tige ne lui convient pas à cause de la grosseur des fruits.

POIRIER Jules Blaise. . . . . *pyramides.* 2 »

Fruit moyen, ayant ordinairement la forme d'un Beurré Diel de petite dimension ; peau jaune verdâtre à la maturité ; chair fondante, parfumée, de première qualité. Maturité : novembre.

POIRIER Louise bonne de printemps . . . . . *pyramides.* 2 75

Arbre vigoureux et très fertile. Fruit moyen ou gros, pyriforme, de couleur jaune pâle flagellé de carmin ; chair fondante, de goût relevé, de première qualité. Maturité : mars-avril.

POIRIER passe-crassane. . . . . *pyramides.* 3 50

Arbre assez vigoureux, très fertile. Fruit moyen, rond, aplati, vert clair tiqueté de brun ; chair fondante, très fine, de goût relevé, de première qualité. Maturité : février-mars.

POMMIER Cox's orange Pippin. . . . . *d'un an sur paradis* 2 »

Arbre assez vigoureux et fertile. Fruit moyen, plus large que haut ; peau jaune orangé ponctué de gris roux, rougeâtre obscur panaché de carmin du côté du soleil ; chair jaunâtre, fine, demi-cassante, juteuse, d'une saveur très agréable. Maturité : novembre à février.

PRUNIER Dunmore. . . . . *tiges.* 2 75

Fruit moyen de première qualité ; mûrit en octobre.

ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

AUCUBA himalaica . . . . . 10 »

Ce bel arbuste toujours vert a été trouvé sur la chaîne la plus humide des monts Sikkim, à une altitude de plus de 3000 mètres ; il diffère de l'Aucuba japonica par ses plus grandes dimensions. Sa tige s'élève de 1 à 2 mètres ; ses feuilles, longues de 15 à 25 centimètres sur 8 à 10 de large, sont luisantes, d'un vert clair dans leur jeunesse, prenant ensuite une teinte plus foncée. Ses fleurs, petites, étoilées, d'un blanc rosé, donnent naissance à des baies ovales, orangé vif, disposées en grappes terminales, qui persistent sur les plantes jusqu'au printemps, produisant un effet pittoresque par le contraste de leur couleur avec celle du feuillage.

Il croît en tout terrain de jardin, à une exposition demi-ombragée de préférence.

CASTANEA chrysophylla. . . . . 15 »

Châtaignier toujours vert, à feuille dorée en dessous ; rustique.

CEANOTHUS Arnoldi. . . . . 5 »

Fleurs en thyrses énormes longs de 20 centimètres, d'un beau bleu de ciel. Variété rustique.

EVONYMUS japonicus ovatus aureo-variegatus. . . . . 8 »

— japonicus foliis albo-striatis. . . . . 8 »

Ces deux variétés ressemblent pour le port à l'Evonymus japonicus ; leurs feuilles sont panachées.

EVONYMUS japonicus macrophyllus. . . . . 6 »

fr. c.

EVONYMUS radicans foliis variegatis. . . . . 6 »

Très joli petit arbuste, reçu du Japon ; d'un port ramassé, avec de petites feuilles ovales d'un vert brillant, tachées et bordées de blanc argenté. Très rustique.
Le port nain et le feuillage distingué de cette plante la rendront particulièrement propre pour bordures, pour corbeilles ou pour garnir des rocailles.

HYDRANGEA cyanea. 2 50

Plante haute de 40 à 60 centimètres, à feuilles larges, ovales et dentelées. Les fleurs sont disposées en larges corymbes blanc rosé strié de rougeâtre ; les fleurs parfaites sont bleues, ainsi que les étamines.

HYDRANGEA japonica flore albo. . . . . 10 »

— japonica flore roseo. . . . . 10 »

Donnent une riche floraison en mai.

LILAS docteur Lindley. . . . . 3 »

Fleurs en thyrses énormes, d'un violet purpurin brillant.

LONICERA brachypoda aureo reticulata. . . . . 6 »

Du Japon. Espèce très curieuse par ses feuilles, qui paraissent comme couvertes d'un réseau jaune d'or, ressemblant ainsi à celles de certains *Anœctochilus*.

LONICERA fuchsioïdes 1 50

Variété à fleur rouge orangé, très belle.

PHILADELPHUS grandiflorus speciosissimus. 1 50

Variété intéressante par son port nain ; ses fleurs sont aussi grandes que celles du type.

ROSIERS.

Livrables en greffes forcées sur sujets nains, à partir du 1er mai 1863.

☞ Ces variétés nous sont inconnues ; nous transcrivons, sans en prendre la responsabilité, les descriptions qu'en ont faites les horticulteurs qui les ont obtenues.

ROSIER Thé mademoiselle Adèle Jougant (*Ledéchaux fils*). 3 50

Arbuste vigoureux ; fleur moyenne, presque pleine, jaune clair.

Ile Bourbon Louise Margottin (*Margottin*). . . . . 5 »

Arbuste vigoureux ; fleur très bien faite, rose très tendre satiné passant au blanc rosé ; issue de *Louise Odier*.

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS.

Alfred de Rougemont (*Lacharme*) . . . . . 4 »

Arbuste vigoureux ; fleur grande, pleine, bien faite, pourpre cramoisi ombré et nuancé de feu vif.

Baron Adolphe de Rothschild (*Lacharme*). . . . . 4 »

Arbuste vigoureux ; fleur grande, bien faite, rouge feu très vif souvent pointillé de blanc.

Baron de Rothschild (*Guillot fils*). . . . . 5 »

Arbuste très vigoureux ; fleur grande, pleine, bien faite, rouge foncé carminé nuancé de violet.

Baronne de Lassus de Saint-Géniès (*Granger*). . . . . 5 »

Arbuste vigoureux ; feuillage vert glauque ; fleur moyenne ou grande, globuleuse, beau rouge cerise nuancé de pourpre ; forme parfaite.

fr. c.

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS (*suite*). Belle des massifs (*Ducher*). 3 50

Arbuste vigoureux ; fleur moyenne, pleine, bien faite, rose vif, dessous des pétales plus pâle.

Comtesse de Courcy (*Lévêque*.). 3 50

Arbuste très vigoureux ; feuillage vert glauque ; fleur moyenne, pleine, bien faite, rose nuancé rouge ; plante très florifère.

Comtesse de Polignac (*Granger*). . . . . 4 »

Arbuste très vigoureux ; feuillage vert glauque ; fleur moyenne ou grande, pleine, rouge ponceau très brillant velouté et nuancé de feu ; coloris superbe.

Duc d'Anjou (*Boyau*) . . . . . 5 »

Arbuste très vigoureux ; feuillage vert foncé ; fleur très grande, pleine, rouge cramoisi nuancé de rouge sombre.

Duc de Bassano (*Portemer fils*). . . . . 4 »

Arbuste vigoureux ; fleur grande, pleine, en forme de coupe, cramoisi foncé velouté.

Gustave Rousseau (*L. Fargeton*). . . . . 4 »

Arbuste très vigoureux ; feuillage vert foncé ; fleur grande, bien imbriquée, rouge violet éclairé de feu, forme parfaite ; très jolie variété.

Henri IV (*Ch. Verdier fils*). 3 50

Fleur moyenne, pleine, pourpre vif.

Impératrice Maria Alexandrina (*Damaizin*). . . . . 4 »

Fleur moyenne, pleine, blanche, d'une belle forme.

Jean Goujon (*Margottin*). . . . . 4 »

Arbuste vigoureux ; fleur grande, pleine, d'un beau rouge clair.

L'Éclatante (*Guillot fils*). . . . . 4 »

Arbuste vigoureux ; fleur moyenne ou grande, pleine, rouge ponceau passant au rouge pourpre violet ; belle tenue.

Le Rhône (*Guillot fils*) . . . . . 4 »

Arbuste vigoureux ; fleur rouge vermillon.

Madame Alfred de Rougemont (*Lacharme*). . . . . 4 »

Arbuste vigoureux ; fleur grande, pleine, forme de *Cent feuilles ;* blanc légèrement ombré de rose, liséré carmin.

Madame Helye (*Portemer fils*). 3 50

Arbuste très vigoureux ; fleur grande, pleine, globuleuse, rouge cramoisi.

Madame William Paul (*Ch. Verdier fils*). . . . . 4 »

Arbuste vigoureux ; fleur grande, pleine, rouge violacé vif nuancé feu.

Peter Lawson (*Thomas*). . . . . 4 »

Arbuste vigoureux ; fleur très grande, pleine, rouge ponceau très vif ombré de carmin.

Président Lincoln (*Granger*). . . . . 5 »

Arbuste très vigoureux ; feuillage vert foncé ; fleur très grande, pleine, imbriquée, beau rouge cerise nuancé de brun superbe ; issue de *Lord Raglan*.

Sœur des anges (*Oger*). . . . . 5 »

Arbuste vigoureux ; fleur très grande, pleine, rose tendre passant au blanc, ayant quelque rapport avec la Rose *Souvenir de la Malmaison*.

fr. c.

ROSIER HYBRIDE REMONTANT. Triomphe d'Angers (*Robert et Moreau*). . . . . 5 »

Arbuste très vigoureux; fleur grande, pleine, bien faite, rouge ponceau velouté et nuancé de carmin.

Les 24 variétés prises ensemble pour 75 francs.

SPIRÆA callosa alba . . . . . 2 »

Cette variété a été trouvée dans les jardins japonais par le docteur von Siebold, qui l'a introduite en Europe. L'extension qu'a prise la culture du Spiræa callosa est une recommandation pour la variété à fleur blanche, qui sera une bonne acquisition pour les jardins et les parcs.

SPIRÆA Nobleana. 1 50

Arbrisseau vigoureux, à tige dressée, à rameaux et branches rougeâtres, intermédiaire entre les Spiræa Douglasii et callosa. Feuilles lancéolées, oblongues aiguës, d'un vert sombre et glabres en dessus, d'un vert pâle et pubescentes en dessous. Fleurs en petits capitules nombreux, dont la réunion imite une panicule, d'un rose pourpre, plus vif que le Spiræa Douglasii.

CONIFÈRES.

ABIES firma (*Siebold* et *Zucarini*). . . . . *sujets de graines de* 0m,10. 50 »

Espèce très belle et rustique qu'on trouve à une altitude de 1000 à 1300 mètres, dans les provinces du centre et du nord du Japon, d'où elle a été introduite en Europe par M. J. G. Veitch. Sa grande hauteur et son port majestueux en font un bel arbre d'ornement; son bois est un des plus utiles et des plus généralement employés par les Japonais.

BIOTA falcata (*Lindley*). . . . . *sujets de graines de* 0m,15. 8 »

Cette espèce, introduite du Japon par M. J. G. Veitch, paraît différer de toutes celles connues dans ce genre. Elle s'élève de 4 à 5 mètres et présente une forme conique avec un feuillage compacte d'un aspect particulier; ses cônes assez gros portent sur chacune de leurs écailles une épine recourbée en arrière ayant la forme d'une petite faucille : c'est ce caractère que le docteur Lindley a pris pour la nommer.

LIBOCEDRUS tetragona (*Endlicher*). . . . . *boutures de têtes*, 0m,15. 25 »

Introduit par MM. Veitch, des Andes de la Patagonie, où il se trouve dans les situations les plus froides et les plus exposées, immédiatement au-dessous de la ligne des neiges. On le rencontre également sur les Cordillères, dans la partie méridionale du Chili, vers le détroit de Magellan. Il forme un grand arbre atteignant de 20 à 35 mètres de hauteur avec une tige droite et peu branchue. Son feuillage est d'un vert pâle, et ses feuilles sont assez serrées pour dissimuler les branches sur lesquelles elles sont disposées par 4 rangs. Son port pyramidal est d'une beauté remarquable qui lui donnera accès dans les parcs et les jardins. Comme arbre d'utilité, il paraît avoir de grandes qualités; son bois, d'un grain fin, est facilement travaillé et passe pour être incorruptible : il est l'objet d'un très grand commerce dans le sud de l'Amérique.

PINUS Koraiensis (*Siebold*). . . . . *sujets d'un an de semis.* 15 »

Cette nouvelle variété (espèce?) paraît voisine du Pin Cembro, dont elle diffère par ses feuilles plus courtes et glauques et par ses grands cônes oblongs dont les écailles ridées ont la pointe tournée en arrière. Les graines en sont grosses et sans ailes, et rappellent celles du Pin pignon; on les mange comme celles de ce dernier. D'après M. J. G. Veitch, qui l'a introduit en Angleterre, ce Pin est très cultivé dans les jardins japonais, mais on ne le trouve pas croissant spontanément dans les localités où les étrangers ont accès.

fr. c.

RETINOSPORA lycopodioïdes. . . . . *sujets de boutures de* 0m,10. 25 »

Introduit du Japon par M. Fortune.

Plante naine, d'aspect roide, dont le feuillage fin, vert foncé et les branches un peu étalées, font une espèce distincte et intéressante. Elle est parfaitement rustique.

SCIADOPITYS verticillata (*Siebold*). Pin parasol. . . . *sujets d'un an de semis.* 15 »

Cet arbre magnifique, peut-être un des plus remarquables que l'on connaisse encore, dit le docteur Lindley, paraît atteindre jusqu'à 30 mètres de hauteur. Sa forme pyramidale, garnie de branches depuis le sol, ses feuilles longues d'environ 10 centimètres, verticillées et nombreuses à l'extrémité des rameaux, en font un des plus beaux arbres qu'on puisse imaginer. C'est encore une introduction due à M. J. G. Veitch.

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

ANEMONE japonica, Honorine Jobert. . . *livrable en mars ; 6 plantes 20 francs, la pièce.* 5 »

Variété à fleur blanche de l'Anemone japonica, rustique et florifère.

BAMBUSA japonica variegata . . . . . 10 »

Introduit du Japon par M. Fortune. Cette plante a l'aspect d'une jolie Graminée touffue, à feuille panachée ; elle paraît naine et sera probablement recherchée pour les bordures.

CANNA Lavallei. . . . . 10 »

Variété dont le mérite principal est dans sa fleur d'un rouge vif, aussi grande qu'une fleur de Glaïeul. La plante est naine, les feuilles en sont lancéolées, pourpres avec les nervures plus foncées.

— metallica . . . . . 10 »

Plante atteignant environ 2m,50 de hauteur ; feuilles ovales-lancéolées, remarquables par leur teinte rougeâtre bronzé.

— picturata fastuosa. . . . . 10 »

Variété recommandable pour sa fleur très grande d'un beau jaune piqueté de rouge comme un Œillet de fantaisie et dont les pétales sont réfléchis. Les plantes sont naines, à feuilles d'un vert glauque.

— rubra superbissima . . . . . 10 »

Plante haute d'environ 2m,50, dont les feuilles sont d'un pourpre brun foncé avec les nervures d'un rouge plus vif.

Ces Canna *seront livrables à partir du* 1er *mai.*

Les quatre variétés pour 35 *francs.*

☞ On remarquera que deux des variétés ci-dessus sont intéressantes au point de vue de leurs fleurs ; elles indiquent déjà un progrès vers le perfectionnement de ce genre de plantes sous le rapport de la floraison. La floraison des Canna en été n'est point à dédaigner, mais elle est surtout précieuse en hiver pour la serre chaude qu'elle orne durant toute la saison.

CHRYSANTHÈME Delphine Caboche . . . . . 3 »

Fleur moyenne, pompon, coquillée, violet extra.

— Hermine Delval . . . . . 3 »

Fleur moyenne, demi-bombée, demi-plane, blanc pur.

fr. c.

CHRYSANTHÈME Indo-Chine . . . . . 3 »
Fleur pompon demi-bombée, bicolore, jaune et rouge.

— Jardin des Plantes . . . . . 3 »
Fleur pompon bombée, rouge passant au jaune.

— Kabylie . . . . . 3 »
Fleur pompon plane, carné pointé or.

— le Luxembourg . . . . . 3 »
Fleur moyenne plane, saumon.

— les Gobelins . . . . . 3 »
Fleur pompon bombée, lilas.

— Lucien Caboche . . . . . 3 »
Fleur pompon demi-bombée, violette.

— Mexico . . . . . 3 »
Grande fleur jaune, coquillée.

— Madame Pecoul . . . . . 3 »
Fleur pompon plane, bicolore, blanc rose et mordoré.

Les dix variétés pour 20 *francs.*

CLEMATIS erecta hybrida . . . . . 8 »
Belle variété hybride rappelant le C. erecta par son port et le C. integrifolia par la couleur et la forme de ses fleurs. Ses tiges s'élèvent de 60 à 80 centimètres ; ses fleurs en grappes bien garnies sont violet foncé avec les étamines jaunes.

DELPHINIUM Hermann Stenger . . . . . 3 »
Fleurs grandes, doubles, bien faites, garnissant bien les rameaux ; chaque pétale est d'un rose satiné reflété de lilas au centre et d'un bleu de ciel intense sur les bords ; les plantes sont vigoureuses.

— ranunculiflorum . . . . . 3 »
Fleur en forme de Renoncule, très double, large de 3 centimètres, bombée ou globuleuse ; les pétales en sont très serrés, imbriqués et un peu renversés, d'un bleu de cobalt, éclairés de blanc au centre. La plante, de taille moyenne, d'un beau port et dont les rameaux sont bien garnis de fleurs, peut être considérée comme un des plus beaux Delphinium.

GAILLARDIA Loiselii 2 50
Variété très vigoureuse dont les fleurs sont plus grandes et de couleurs plus vives que celles du G. grandiflora.

GLAÏEUL Flore (*Souchet*) . . . . . 9 »
Fleur grande, de forme parfaite, fond blanc nuancé de rose lilacé, avec de très grandes macules roses bien accusées ; épi très long.

— impératrice Eugénie (S.) . . . . . 10 »
Fleur très grande, de forme parfaite, fond blanc flammé de rose, légèrement violacée à l'intérieur, lilas à l'extérieur. Cette variété est la plus remarquable de toutes celles connues.

Ne pas confondre le Glaïeul IMPÉRATRICE EUGÉNIE *avec le G.* IMPÉRATRICE, *variété déjà ancienne.*

— Stephenson (S.) . . . . . 9 «
Fleur grande, de forme parfaite, cerise carminé ligné de blanc ; très bel épi.

fr. c.

LYCHNIS Gampi. . . . . 8 »

Fleur d'un jaune orangé tacheté de blanc.

— sanguinea grandiflora. . . . . 3 »

Espèce du Japon, à grande fleur rouge de sang.

MIMULUS cupreus. . . . . 2 »

Jolie plante vivace rustique, découverte par M. Pearce, collecteur de MM. Veitch, dans les Andes du Chili, à une altitude d'environ 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Elle forme une touffe pouvant s'élever de 30 à 60 centimètres, qui donne en abondance pendant l'été des fleurs d'un rouge orangé avec le centre jaune vif. Ce sera une bonne plante pour les bordures et les corbeilles.

ŒILLET Flon Marie Paré, fleur blanc pur. . . . . *suivant la force.* » 75 à 1 »

— Flon Émile Paré, fleur panachée. . . . . *suivant la force.* 1 50 à 2 »

Variétés aussi rustiques, aussi vigoureuses et surtout aussi florifères que la variété ou hybride dont elles sont sorties. L'Œillet Flon, appelé aussi *Dianthus semperflorens* et *D. hybridus multiflorus*, est une excellente plante pour les massifs ou pour les corbeilles; on a pu l'apprécier pendant l'exposition d'horticulture de l'année dernière. Sa floraison dure toute l'année; rentré sous châssis, il fleurit encore pendant l'hiver.

PENTSTEMON Actéon . . . . . 5 »

Fleur moyenne rose brillant, pourtour de la gorge rose plus tendre, centre veiné de plus foncé; forte panicule serrée.

— Curiosité. . . . . 5 »

Jolie petite fleur d'un carmin brillant à bords roses et à centre blanc; plante très naine, panicule serrée.

— Dame Blanche . . . . . 3 »

Fleur grande, blanc pur.

— Distinction. . . . . 5 »

Fleur violet foncé, gorge pourpre et blanc.

— Évêque Myriel. . . . . 4 »

Fleurs très grandes agglomérées sur les tiges; extérieur du tube lilas rosé foncé, gorge blanc pur, bords lilas.

— F. Hock. . . . . 4 »

Fleur grande, bien faite, à tube très large, rose pur, à gorge bien nette d'un blanc saumoné.

— Mignon. . . . . 5 »

Fleur violette, à gorge blanche striée de marron, bords de la corolle lilas.

— Thibaut et Keteleer . . . . . 4 »

Fleur moyenne, d'un violet puce foncé, gorge blanc pur; plante à effet.

— Van Volxem. . . . . 4 »

Fleur grande, rose vif, gorge blanc saumoné.

— violaceum superbum. . . . . 5 »

Fleur moyenne, violet pourpre bordé de rose foncé, à centre veiné de noir; plante très naine, à panicule très serrée.

— Wiot . . . . . 4 »

Fleur grande, de forme parfaite, d'un très beau rose carminé vif, gorge d'un blanc pur nettement tranché.

fr. c.

PHLOX Alphonse Dufoy (*Fontaine*). . . . . *la pièce.* 4 »
Fleur rouge à reflet violacé.

— Baron d'Avesne (*Lierval*). . . . . — 4 »
Fleur rose violacé, centre cocciné.

— Charles Rouillard (*F.*) . . . . . — 4 »
Fleur cerise feu, centre pourpre.

— Dumont de Courset (*F.*) . . . . . — 4 »
Fleur rose vif, centre carminé.

— Édouard Andry (*F.*) . . . . . — 4 »
Fleur cerise feu foncé, brillant.

— Gustave Duchesne (*L.*) . . . . . — 4
Fleur saumon giroflée.

— Hector Rouillard (*F.*) . . . . . — 4 »
Fleur cerise feu.

— Madame Berniau (*L.*) . . . . . — 4 »
Fleur violet pourpre foncé très brillant.

— Madame Charral (*L.*) . . . . . — 4 »
Fleur fond blanc, centre rouge.

— Madame Godefroy (*L.*) . . . . . — 4 »
Fleur rouge violacé, magnifique.

— Madame Kumph (*L.*) . . . . . — 4 »
Fleur rouge, centre cocciné glacé de violet.

— Madame Petit (*L.*) . . . . . — 4 »
Fleur rose très large.

— Mademoiselle Ladoucette (*L.*) . . . . . 4 »
Fleur blanche, centre largement marqué, rose ombré de rouge; variété de mérite.

— M. Chauvière (*F.*) . . . . . 4 »
Fleur violet foncé; variété de choix.

— M. Duruflé (*L.*) . . . . . 4 »
Fleur rouge vif; variété de choix.

— M. Guihou (*F.*) . . . . . 4 »
Fleur pourpre foncé.

— Souvenir de M. Pirole (*F.*) . . . . . 4 »
Fleur saumoneé, de forme parfaite.

— Vicomtesse de Belleval (*L.*) . . . . . 4 »
Fleur saumoné ponceau; variété de mérite.

Ces variétés de Phlox *seront livrables à partir du* 1er *mai.*

La collection entière, 18 *variétés, pour* 60 *francs.*

REINECKEA carnea foliis variegatis . . . . . 8 »
Trouvé par Siebold dans les jardins du Japon. C'est une plante gazonnante, haute de 10 à 15 centimètres, à feuilles étroites, longues, retombantes, rappe-

fr. c.

lant celles d'une Graminée, et rayées longitudinalement de vert et de jaune. Les fleurs, nombreuses, en étoile, disposées en épis, sont carnées à l'intérieur avec les étamines jaunes, et d'un violet pourpre à l'extérieur, ainsi que les bractées, les tiges et les boutons floraux. Culture sous châssis froid ou à bonne exposition.

SEDUM carneum variegatum . . . . . *la pièce* 40 cent., *la douzaine.* 4 »

Plante gazonnante, charnue, succulente, dont les nombreuses tiges déliées sont rose pâle ou couleur de chair et les feuilles lancéolées, vertes, bordées de blanc. Jolie plante pour les vases à suspension et pour les rocailles.

SYMPHYTUM asperrimum variegatum. Consoude à feuille rude panachée, *suivant la force*, 2 fr. à 5 »

Feuilles d'un vert cendré, largement, irrégulièrement panachées et bordées de jaune passant au blanc pur ; plante d'un assez bon effet.

VERONICA hybrida multiflora . . . . . 3 »

Plante naine et florifère, ayant le port du Veronica salicifolia ; fleur violet lilacé.

PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE

à feuillage ou à port ornemental, propres à la décoration des pelouses pendant l'été.

☞ Les plantes de cette section seront livrables en mai ; c'est l'époque où l'on peut commencer à les planter en pleine terre sans risques de les perdre.

EUCALYPTUS globulus. . . . . 6 »

Espèce ornementale par son port. Plantée en mai en plein air, sa tige peut s'élever jusqu'à 3 mètres de hauteur pendant la durée de la belle saison : ses rameaux nombreux, étalés dès la base, lui donnent la forme d'une vaste pyramide reposant sur le gazon. Ses feuilles blanchâtres, ainsi que les rameaux, présentent un aspect curieux.

GNAPHALIUM lanatum. . . . . *le cent*, 40 fr., *la pièce.* » 50

Plante velue, blanchâtre dans toutes ses parties, rameuse, étalée, formant une touffe d'environ 30 centimètres de hauteur. Elle produira un bon effet par le contraste des couleurs en bordures autour des massifs de plantes à feuillage coloré, telles que le Coleus Verschaffeltii, le Perilla, l'Amarante à feuille rouge, etc. On la plante en pleine terre en mai, pour la rentrer en serre tempérée ou en orangerie à l'approche des gelées.

HIBISCUS ferox. . . . . 3 »

Plante à feuillage ornemental, originaire de la Nouvelle-Grenade, encore peu répandue, bien qu'elle soit introduite en Europe depuis un certain nombre d'années. Sa tige est dressée, couverte d'aiguillons ; ses feuilles, très grandes, sont arrondies, dentées, fortement réticulées, parsemées d'aiguillons et d'un très bel effet.

L'Hibiscus ferox demande une terre riche et profonde, et peut être mis en plein air en été. La culture en pots ne lui convient pas, ses racines n'y trouvant pas une nourriture assez abondante.

MONTAGNÆA heracleifolia. . . . . 3 »

Très belle plante à port ornemental. Sa tige est droite et robuste ; ses feuilles, très grandes, souvent de près d'un mètre de longueur sur 60 à 70 centimètres de large, sont profondément, irrégulièrement découpées et comme déchirées, retombantes de tous côtés et d'un vert foncé. Elle nous paraît être d'un mérite supérieur à celui du Ferdinanda pour l'aspect pittoresque de ses feuilles. Mise en pleine

fr. c.

terre en mai, sortant à peine de terre, nous l'avons vue, dans le cours de la saison, atteindre une hauteur de près de 3 mètres. Serre tempérée ou orangerie l'hiver.

SCHISTOCARPUS albus. . . . . 2 »

Plante à feuillage ornemental de pleine terre en été, dont le mérite n'est pas encore bien constaté. Sa tige est droite, forte, haute de 1m,50 environ; ses feuilles, en forme de coin, convexes et gaufrées, sont très grandes et blanchâtres velues en dessous.

SOLANUM discolor. S. galeatum. . . . . 4 »

Belle espèce à feuillage ornemental et de pleine terre pendant l'été. Sa tige, dressée et forte, s'élève à 1m,50 et 2 mètres; ses feuilles, longues de 50 centimètres sur 40 de large, sont presque horizontales, planes, largement sinuées acuminées, épineuses, d'un vert foncé en dessus, d'un pourpre vineux à réseau vert en dessous; elles sont portées par de forts pétioles. Le port élégant de cette plante la recommande au même titre que le Wigandia et autres plantes à feuillage ornemental, pour la décoration des pelouses pendant l'été.

SOLANUM frondulosum . . . . . 6 »

Espèce encore peu connue. Cependant, dans un article de la *Revue horticole*, on dit qu'elle paraît être une plante du plus grand mérite. Nous n'en avons encore vu qu'un petit sujet servant pour la multiplication, par conséquent mutilé, dont la tige, les pétioles et les feuilles, hérissés de longs poils laineux et blanchâtres, nous ont paru très curieux.

SOLANUM. N° 2, espèce de San-Pedro. . . . . 3 »

Espèce encore sans nom, reçue d'Allemagne, et qui paraît avoir un certain mérite. Ses feuilles, longues d'environ 50 centimètres sur un peu moins de largeur, portées par de longs pétioles, sont horizontales, planes, velues, un peu épineuses sur les nervures, et largement sinuées acuminées, imitant en grand pour la forme une feuille de Houx.

UHDEA bipinnata. . . . . 3 »

Belle plante à feuillage ornemental et de pleine terre en été. Sa tige est droite, forte, et porte de très grandes feuilles opposées, un peu retombantes, profondément et régulièrement découpées. L'Uhdea passe pour être aussi ornemental, aussi pittoresque que le Montagnæa : nous n'avons pas encore été à même d'en voir des pieds forts, cependant ceux que nous avons vus nous portent à croire que cette opinion sera justifiée.

PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE.

ABUTILON aurantiacum. . . . . 2 »

Grande et belle fleur d'un jaune orangé.

— luteum album. . . . . 2 »

Fleur jaune-paille d'une jolie forme.

— miniature . . . . . 2 »

Fleur d'un beau rose veiné et teinté de saumon.

— roseum superbum. . . . . 2 »

Fleur rose violacé vif.

— sulphureum. . . . . 2 »

Fleur très grande, d'un jaune-soufre légèrement rosé.

fr. c.

AZALEA INDICA Advance . . . . . 5 »
Fleur rose lilacé, tachée de cramoisi marron.

— Aphrodite . . . . . 2 »
Fleur rose lilacé glacé satiné.

— Charles Enke . . . . . 3 »
Fleur rose pâle à bords blancs, striée de violet.

— Dieudonné Spae . . . . . 3 »
Fleur très grande vergetée de rose vif sur fond blanc, bordée de blanc pur avec des macules cramoisi foncé ; très belle variété.

— Duc d'Aremberg . . . . . 3 »
Fleur de forme parfaite, fond blanc vergeté de rose avec des panachures écarlates disposées comme celles d'un Œillet flamand ; macule coccinée.

— Flower of the day . . . . . 3 »
Fleur grande, blanche, panachée de rose ; d'une belle forme.

— insignis . . . . . 4 »
Fleur double, écarlate.

— Kinghornii . . . . . 3 »
Fleur rose brillant, finement tachetée rose pourpre.

— Magnet . . . . . 3 »
Fleur rose saumoné brillant.

— Mars . . . . . 3 »
Fleur orange brillant, richement maculée de pourpre cramoisi.

— Miltonii . . . . . 2 »
Fleur rose lilacé, la partie supérieure finement tachetée.

— Paulina Mardner . . . . . 4 »
Fleur semi-double de forme arrondie, d'un beau rose.

— Prinz Franz Joseph . . . . . 4 »
Fleur grande, rouge saumon.

— Président . . . . . 3 »
Fleur rouge saumoné, bien faite.

— Président Claeys . . . . . 2 »
Fleur saumon bordée de blanc pur.

— Professeur Lemaire . . . . . 3 »
Fleur rose passant au rose pâle, coccinée dans la partie supérieure, pointillée cramoisi avec quelques lignes d'une teinte plus décidée.

— Sir Henry Havelock . . . . . 3 »
Fleur large, saumon brillant, élégamment tachetée, bien étoffée.

— Standard of perfection . . . . . 2 »
Fleur rose brillant, d'une belle forme ; variété vigoureuse.

— Tricolor . . . . . 5 »
Fleur blanche flammée et maculée de rouge.

— variegata superba . . . . . 2 »
Fleur saumon, bordée de blanc.

fr. c.

CHORIZEMA Hugelii . . . . . 4 »

Jolie variété nouvelle à fleur d'un jaune orangé.

COBÆA scandens variegata. . . . . 2 »

Très belle variété à feuille panachée et d'une croissance rapide. Comme le type, elle est des plus convenables pour garnir des treillages ou pour grimper autour des colonnes ; elle est plus délicate que la variété ordinaire, cependant il est probable qu'elle pourra passer l'été en plein air.

DIPLACUS hybridus puniceo-aurantiacus. 1 50

Fleur d'une belle couleur orange foncé lavé de laque, avec deux macules longitudinales jaune d'or à la base ; tube rose tendre et gorge aurore.

DIPLACUS hybridus Ingelrelstii. 1 50

Fleur rouge vermillon foncé, maculée de jaune d'or ; gorge rose tendre.

DIPLACUS hybridus splendidus. 1 50

Fleur de couleur orange mélangé de laque carminé, maculée de jaune d'or ; gorge rose.

ERYTHRINA ruberrima . . . . . 4 »

Variété nouvelle de M. Bellanger. Plante vigoureuse et très florifère, à grande fleur d'un rouge amarante passant au rouge foncé.

FICUS Cooperi (*Veitch*). . . . . 8 »

Introduit par Sir Dan. Cooper, de la Nouvelle-Galles du Sud. C'est une belle plante à feuillage ornemental pour la serre tempérée. Elle pousse vigoureusement et donne de larges feuilles d'un vert foncé, luisantes, dont les nervures, proéminentes, sont d'un rouge foncé. Elle sera sans doute utile pour la décoration des appartements et jardins d'hiver au même titre que le Ficus elastica, et comme lui elle pourra probablement passer l'été en plein air.

FUCHSIA. Variétés à fleurs simples.

— Bianca marginata. . . . . 3 »

Corolle laque cramoisi, sépales blancs à pointes vertes. Florifère.

— Castor. . . . . 4 »

Fleur violet foncé, panachée de bleu.

— Her Majesty. . . . . 2 »

Corolle lilas rosé, sépales très longs, réfléchis, blanc de neige.

— Mars . . . . . 3 »

Corolle violet bleuâtre reflété de cuivré, sépales larges, carmin écarlate, réfléchis.

— Monsieur Rougier. . . . . 4 »

Tube et sépales rouge foncé, centre violet foncé.

— Pollux. . . . . 4 »

Tube et sépales blancs, centre violet clair.

— Reine Blanche. . . . . 2 »

Corolle laque brillant, sépales rose carné.

— Sensation . . . . . 2 »

Corolle pourpre, se déployant horizontalement ; sépales cramoisis.

— The best. . . . . 2 »

Corolle blanche, sépales rouges.

— Turban . . . . . 2 »

Corolle bleu foncé, sépales cramoisis.

fr. c.

FUCHSIA. Variétés à fleurs doubles

— Bravo . . . . . 2 »
Corolle bleu foncé, sépales cramoisis.

— Brightness . . . . . 2 »
Corolle pourpre, sépales longs, d'un riche cramoisi.

— Charles XII . . . . . 2 »
Corolle pourpre noir velouté ; sépales réfléchis, cramoisis ; c'est la fleur double du coloris le plus foncé qui existe.

— Gem of the Season . . . . . 2 »
Corolle violette, sépales d'un cramoisi foncé.

— International . . . . . 2 »
Corolle pourpre, sépales d'un rouge clair.

— Le florifère . . . . . 2 »
Pétales réguliers d'un bleu violet passant au violet laque, sépales rouge clair. C'est le plus florifère de tous les Fuchsias à fleurs doubles.

— Le Siamois . . . . . 2 »
Corolle à très longs pétales d'un bleu veiné de violet rosé ; sépales très grands, réfléchis, d'un rose carmin.

— Madame Rougier . . . . . 4 »

— Mastodonte . . . . . 2 »
Fleur énorme ; corolle grande, pourpre foncé velouté avec des reflets cuivrés ; sépales écarlate vif.

— Meet frères . . . . . 2 »
Fleur très grosse ; corolle violet clair, sépales carmin vif. Plante naine et très florifère.

— Président Porcher . . . . . 2 »
Fleur très grande ; pétales larges, bleu indigo ; sépales très longs, carmin vif.

— J. Rhoda . . . . . 4 »
Corolle laque violacé nuancé de bleu ; sépales très larges, écarlates.

— Universal . . . . . 2 »
Fleur grande ; corolle violette ; sépales larges, réfléchis, cramoisi brillant.

GASTROLOBIUM Drummondii . . . . . 3 »
Très jolie plante à fleur orange mêlé de pourpre.

HÉLIOTROPE madame Chauvière . . . . . 4 »
Fleur lilas foncé passant au lilas clair, en ombelles énormes. C'est une variété naine et compacte du premier ordre.

— Madame Boulanger . . . . . 4 »
Fleur très grande, violet clair avec un large centre blanc. Variété très florifère.

INDIGOFERA latifolia . . . . . 3 »

LANTANA Cléopâtre . . . . . 3 »
Fleur énorme, rose, à centre jaune d'or.

— Fabiola . . . . . 3 »
Fleur grande, blanc pur entouré de rose tendre, s'épanouissant parfaitement.

fr. c.

LANTANA M. Rendatler . . . . . 3 »

Fleur énorme, aurore nuancé de rose et de saumon, centre plus foncé. Variété très florifère, à grosse ombelle serrée.

LITHOSPERMUM fruticosum 2 50

Très joli arbuste nouveau, florifère et d'un port ramassé, à fleurs d'un bleu indigo. Originaire du nord de l'Espagne, on croit qu'il sera rustique sous notre climat.

OTACANTHUS cæruleus . . . . . 5 »

Plante nouvelle et élégante, de la famille des *Acanthacées*, dont les tiges nombreuses forment un buisson touffu qui se couvre de fleurs d'un bleu indigo d'un bel effet. Il est probable qu'elle pourra être utilisée en massifs en pleine terre pendant l'été.

OURISIA coccinea . . . . . 4 »

Plante herbacée nouvelle, découverte à une grande élévation sur les Andes du Chili et introduite par MM. Veitch. Son port rappelle celui d'un Primula par ses feuilles radicales arrondies formant une sorte de touffe, d'où sortent de nombreuses hampes hautes d'environ 40 centimètres. Les fleurs, nombreuses, ressemblent, par leur forme longuement tubuleuse, à celles d'un Pentstemon ; elles sont d'une brillante couleur rouge. Il est probable que cette plante sera rustique sous notre climat : elle a déjà passé en Angleterre deux hivers sans abri.

PASSIFLORA cœlestina . . . . . 5 »

Fleur rose nuancé de bleu, très jolie.

PELARGONIUM. Variétés à grandes fleurs. *Livrables à partir du 15 mars.*

— Anacréon (*Malet*) . . . . . 10 »

Fleur carmin orange pourpré à centre blanc ; pétales supérieurs maculés de marron, les inférieurs légèrement maculés de pourpre.

— Anna Duval (*Duval*) . . . . . 10 »

Fleur lilas rosé ; pétales supérieurs maculés de marron noir, les inférieurs légèrement maculés et striés de pourpre.

— Asmodée (*M.*) . . . . . 10 »

Fleur rose cerise vif à centre blanc ; pétales supérieurs nervés et maculés de marron, les inférieurs légèrement nervés et maculés de pourpre.

— Comte de Gomer (*D.*) . . . . . 10 »

Pétales supérieurs carmin et marron, les inférieurs rose carminé et blanc, légèrement maculés de pourpre.

— Cuvier (*M.*) . . . . . 10 »

Fleur rose légèrement saumoné, nervé carmin ; macules noires sur les cinq pétales.

— Decandolle (*D.*) . . . . . 10 »

Fleur carmin clair à centre blanc, macules marron noir sur les cinq pétales.

— Eugène Guenoux (*D.*) . . . . . 10 »

Pétales supérieurs noir et vermillon, les inférieurs orange vif, maculés de marron noir ; centre blanc.

— Frédéric Schlumberger (*D.*) . . . . . 10 »

Fleur d'un magnifique pourpre marron, à centre blanc.

— Le Vésuve (*D.*) . . . . . 10 »

Fleur vermillon feu, pétales supérieurs maculés de marron.

fr. c.

PELARGONIUM à grandes fleurs (*suite*). Madame Lansezeur (*D.*). . . . . 10 »

Fleur rose cerise carminé, à centre blanc et violacé; pétales supérieurs légèrement maculés et nervés de marron noir.

— Monsieur Warocqué (*D.*) . . . . . 10 »

Fleur blanche au centre, pétales maculés de rose carmin, légèrement striés de pourpre et bordés de blanc.

— Némésis (*D.*). . . . . 10 »

Fleur lilas tendre violacé, bordée de blanc, maculée sur les cinq pétales de marron pourpre violacé.

— Neptune (*M.*) . . . . . 10 »

Fleur pourpre amarante; pétales supérieurs maculés de noir, centre blanc violacé.

— Thétis (*M.*) . . . . . 10 »

Pétales supérieurs marron noir, les inférieurs marron clair; centre blanc violacé.

PELARGONIUM. Variétés anglaises à grandes fleurs.

— Ardens (*Beck*). . . . . 10 »

Pétales supérieurs noirs ombrés de marron et bordés de cramoisi, les inférieurs d'un riche cramoisi.

— Beacon (*Hoyle*) . . . . . 10 »

Fleur cramoisie.

— Bellatric (*B.*). . . . . 10 »

Pétales supérieurs marron bordés d'écarlate, les inférieurs cramoisi écarlate.

— Colossus (*H.*) . . . . . 10 »

Pétales supérieurs roses maculés de marron, les inférieurs roses teintés de rouge; centre plus clair.

— Improvement (*Foster*) . . . . . 10 »

Pétales supérieurs marron bordés de rose pourpre, les inférieurs pourpres.

— Inez (*H.*) . . . . . 10 »

Pétales supérieurs d'un marron riche, bordés de carmin, les inférieurs orangés ombrés de rouge; centre blanc.

— Lord Palmerston (*H.*) . . . . . 10 »

Pétales supérieurs noirs ombrés de carmin, les inférieurs d'un pourpre brillant.

— Oriana (*B.*). . . . . 10 »

Pétales supérieurs orangés bordés de rose et maculés de marron, les inférieurs couleur pêche.

— Périclès (*H.*). . . . . 10 »

Pétales supérieurs rose carminé largement maculés de noir, les inférieurs blancs.

— Royalty (*F.*) . . . . . 10 »

Pétales supérieurs roses largement maculés de noir, les inférieurs rose pourpre; centre blanc.

— Royal Albert (*H.*) . . . . . 10 »

Pétales supérieurs orangés maculés de noir, les inférieurs roses; centre blanc.

fr. c.

PELARGONIUM. Variétés dites fantaisie.

— Amethyst (*Turner*) . . . . . 5 »
Fleur cramoisi pourpre foncé.

— Bellissima (*T.*) . . . . . 4 »
Fleur rose pâle à bords et centre plus clairs.

— Black prince (*T.*) . . . . . 8 »
Fleur marron foncé à centre lilas.

— Butterfly (*T.*) . . . . . 5 »
Fleur blanc lilacé légèrement maculée de pourpre.

— Édith (*T.*) . . . . . 8 »
Pétales supérieurs d'un carmin brillant, les inférieurs ombrés de cerise.

— Ellen Beck (*T.*) . . . . . 8 »
Fleur lilas carminé, bords et centre brillants.

— Godfrey (*T.*) . . . . . 5 »
Fleur cramoisi foncé, bords et centre plus clairs.

— Lady Towers (*T.*) . . . . . 8 »
Fleur rose laque teinté de violet, bords et centre plus clairs.

— Lilac Queen (*T.*) . . . . . 5 »
Fleur lilas rougeâtre, pétales supérieurs maculés de marron.

— Marie Rougier . . . . . 4 »
Pétales supérieurs rose lilacé, bordés et maculés de blanc, les inférieurs blanc de neige.

— Miss in her teens (*T.*) . . . . . 8 »
Pétales supérieurs cerise brillant, les inférieurs ombrés de cramoisi; centre blanc.

— Mrs. Marnock (*T.*) . . . . . 8 »
Pétales supérieurs d'un beau cramoisi, les inférieurs ombrés de violet.

— Mrs. Reynolds Hole (*T.*) . . . . . 8 »
Fleur blanc pur maculée de cerise.

— Palma Castellan . . . . . 10 »
Fleur d'un joli rose tendre, pétales supérieurs maculés de carmin clair et bordés de blanc.

— Vénus (*T.*) . . . . . 5 »
Fleur lilas tendre, centre et bords plus clairs.

PELARGONIUM. Variétés inquinans et zonale.

— Amelina Grisau 2 50
Fleur blanc rosé à large centre rouge vif.

— Cécile Labbé . . . . . 7 »
Fleur rose saumoné vif bordée de blanc.

— Fanny Labrousse . . . . . 5 »
Fleur saumon à centre blanc. Variété naine.

— Madame Lemoine 2 50
Fleur rose saumoné.

fr. c.

PELARGONIUM inquinans et zonale (*suite*). Magenta. . . . . 2 »
Fleur cerise amarante.

— Marie Labbé. . . . . 7 »
Fleur blanche à large centre rose saumoné, ombelle compacte. Variété de choix.

— M. Mangenet . . . . . 5 »
Fleur ponceau clair très large, ombelle énorme et compacte.

— Prince impérial . . . . . 5 »
Fleur écarlate brillant à centre blanc. Variété naine.

— Roi d'Italie . . . . . 3 »
Fleur rose de Chine éclatant, nuancé de minium ; centre blanc.

— Rothomago . . . . . 5 »
Fleur ponceau mêlé d'écarlate.

PETUNIA. Variétés à fleurs simples. *Livrables à partir du 1er avril.*

— Admiration . . . . . 2 »
Fleur carmin vif à larges taches blanches, gorge noire.

— Auguste Hémelot . . . . . 2 »
Fleur grande à fond blanc rosé, réticulée de pourpre et de cramoisi. Très florifère.

— Cassandra . . . . . 2 »
Fleur grande, violet clair, rubanée de blanc.

— Cléopâtre . . . . . 2 »
Fleur moyenne, rose violacé, bordée de blanc.

— Cupidon . . . . . 2 »
Fleur carmin pourpré, nuancée de violet et rayée de noir. Belle variété.

— Déjanire . . . . . 2 »
Fleur violet pourpré.

— Diane . . . . . 2 »
Fleur lilas veiné de pourpre, lignée et bordée de blanc. Curieuse.

— Emile Chaté . . . . . 2 »
Fleur des plus larges, d'un beau rose foncé, centre blanc lilacé.

— Esculape . . . . . 2 »
Fleur grande, pourpre velouté nuancé ; bonne forme.

— Hérodote . . . . . 2 »
Fleur grande, rouge amarante, striée de blanc pur, gorge noire veinée de pourpre. Variété très florifère.

— Joinville . . . . . 2 »
Fleur grande, pourpre, réticulée de cramoisi, bordée de rose carné, gorge noire.

— Louisa. . . . . 2 »
Fleur rouge foncé, veloutée, panachée et striée.

— Médée . . . . . 2 »
Fleur grande, bien faite, rose vif strié noir, bordée de lilas.

fr. c.

PETUNIA à fleurs simples (*suite*). Mademoiselle Jenny Bourgon. . . . . 2 »
Fleur rouge foncé ombré de violet, gorge blanc pur.

— Marie Butte. . . . . 2 »
Fleur rouge vif, réticulée de blanc.

— Reine Hortense. . . . . 2 »
Fleur très grande, lilas bleuâtre, veinée de plus foncé et maculée de blanc.

— Stuart Low . . . . . 2 »
Fleur lilas, fortement veinée de violet évêque, centre noir.

— Surpasse madame Rendatler. . . . . 2 »
Fleur très grande, carné vif, à gorge blanche.

— Vincent de Paul. . . . . 2 »
Fleur très grande, rose pourpre, à gorge brun foncé, bordée de lilas.

Douze variétés au choix pour 20 *francs.*

PETUNIA. Variétés à fleurs doubles. *Livrables à partir du* 1er *avril.*

— Démosthène . . . . . 2 »
Fleur grande, pourpre foncé, de forme parfaite.

— Diane. . . . . 2 »
Fleur grande, blanc de nacre glacé de rose.

— Docteur Demange. . . . . 2 »
Fleur rouge striée de blanc.

— Duc de Guise . . . . . 2 »
Fleur grande, rose foncé, réticulée de pourpre et de cramoisi.

— François Lhuillier. . . . . 2 »
Fleur très grande, lilas clair, largement bordée de blanc pur.

— Ganymède. . . . . 2 »
Fleur moyenne, rouge pourpre, d'un grand effet.

— Gigantea plena . . . . . 2 »
Fleur rose tendre, nuancée de blanc et de lilas, plus grande que celles de toutes les autres variétés.

— Hortensia . . . . . 2 »
Fleur moyenne, rose clair, bordée de blanc.

— Madame Racouchot. . . . . 2 »
Fleur énorme, rose et violet, maculée de blanc pur.

— Madame Sablières. . . . . 2 »
Fleur grande, blanche, maculée de violet vif au centre.

— Madame Ingelrelst . . . . . 2 »
Fleur rouge ponceau velouté.

— Madeleine. . . . . 2 »
Fleur grande, rose pourpre, bordée de blanc.

— Marie Stuart . . . . . 2 »
Fleur énorme, couleur de chair, légèrement veinée de violet au centre.

fr. c.

PETUNIA à fleurs doubles (*suite*). Monsieur l'abbé Noël. . . . . 2 »
Fleur rouge très vif, imbriquée.

— Monsieur Hoste. . . . . 2 »
Fleur très grande, rose hortensia, bordée de vert.

— Monsieur Lequesne. . . . . 2 »
Fleur grande, blanc lilacé, veinée de bleu.

— Monsieur Richalet. . . . . 2 »
Fleur lilas ardoisé, tachée de blanc.

— Nardy frères. . . . . 2 »
Fleur violet vif, veinée de cramoisi, pointée de vert.

— Neptune. . . . . 2 »
Fleur très grande, rose lilacé.

— Phébus. . . . . 2 »
Fleur très grande, amarante foncé, imbriquée.

— Président Desrobert. . . . . 2 »
Fleur grande, rouge foncé, rubanée et striée de blanc.

— Rosea superba . . . . . 2 »
Fleur grande, rose frais, imbriquée.

— Sainte Agnès . . . . . 2 »
Fleur grande, blanc pur.

— Souvenir de M. Vincent. . . . . 2 »
Fleur très grande, rouge vif violacé, bordée et maculée de blanc pur.

— Virginia. . . . . 2 »
Fleur moyenne, amarante foncé, veinée de pourpre, maculée et bordée de blanc.

Douze variétés au choix pour 20 *francs.*

SALVIA lantanæfolia. . . . . 3 »

Du Mexique, où elle croît à une altitude très élevée. Les feuilles de cette Sauge rappellent celles des Lantana ; ses fleurs, petites, de couleur améthyste, sont disposées en grappes simples et nombreuses à l'extrémité des rameaux, et contrastent agréablement avec la couleur foncée du feuillage. Son port nain et compacte en fait une jolie plante, qui pourra probablement passer l'été en plein air sous notre climat.

SISYRINCHIUM versicolor . . . . . 8 »
Jolie plante à feuilles étroites et à fleurs panachées.

SWAINSONIA miniata 2 50
Fleur rose foncé.

— Rollissonii . . . . . 4 »
Fleur rose foncé en longs épis.

— coccinea . . . . . 3 »
Fleur rouge.

VERVEINES, une vingtaine de belles variétés nouvelles. . . . . *la douzaine.* 15 »
la pièce. 1 50

PLANTES DE SERRE CHAUDE.

fr. c.

ACHIMENES Leighii . . . . . 2 »
Fleur violet pourpre, maculée de carmin au centre.

— Mauve perfection . . . . . 2 »
Bonne variété, couleur nouvelle.

— Rosea elegans . . . . . 2 »
Fleur rose brillant élégamment maculée au centre.

— Rosea magnifica . . . . . 2 »
Fleur cramoisi, carminée vers les bords, ponctuée de violet cramoisi.

APHELANDRA Liboni . . . . . 10 »
Fleur jaune d'or en beaux épis, bractées moins foncées; beau feuillage.

BEGONIA Dædalea . . . . . 5 »
Feuilles cordées obliques, peltées, charnues, d'un vert porcelaine brillant, ornées d'un réseau brun, portées par de longs pétioles maculés de rouge et couverts de longs poils rosés. Les fleurs sont blanc rosé, fort jolies.

BEGONIA imperialis. . . . . 5 »
Espèce petite, un peu rampante, hérissée de petits poils. Feuilles épaisses, ovales arrondies, un peu acuminées, cordiformes à la base, d'un brun plus ou moins foncé selon leur âge, tandis que les nervures sont largement bordées de chaque côté d'un beau vert. Fleurs blanches.

BEGONIA longipila . . . . . 5 »
Grande et belle plante à tige robuste et rampante. Feuilles profondément divisées, échancrées-cordiformes à la base, à lobes pennatifides, la face supérieure d'un vert sombre et mat avec les nervures très largement bordées de vert clair, la face inférieure rouge brun avec nervures vert pâle ou jaunâtres; les pétioles, longs, d'un rouge brun, sont hérissés de longs poils panachés de couleurs vives, plus longs et en bouquets vers l'insertion de la feuille. Fleurs roses grandes.

BEGONIA smaragdina. . . . . 5 »
Ressemble au Begonia imperialis par ses formes. Les feuilles sont hérissées de petites verrues serrées et rappellent la peau de chagrin, leur couleur est d'un vert-émeraude en dessus; les nervures forment sur la face inférieure un réseau d'une grande finesse et d'un joli coup d'œil.

BELOPERONE pulchella. . . . . 5 »
Charmante plante du Brésil méridional, intéressante par sa floraison abondante. Fleurs en bouquets, d'un pourpre violet, avec une macule pourpre foncé striée de blanc à la base de la lèvre.

CALADIUM Devosianum . . . . . 8 »
Très grandes feuilles peltées, à base large, semi-lancéolées aiguës, d'un vert superbe, bordées de rouge dans l'échancrure et tachées çà et là par des groupes de nombreuses petites macules d'un blanc d'argent translucide; les nervures sont bordées érosées de vert pâle, et les pétioles, d'un vert clair, portent quelques larges lignes brunes d'un bel effet.

— Lemaireanum . . . . . 6 »
Fort jolie petite espèce à feuilles peltées, étroitement hastées, à fond vert, sur lequel se détachent les nervures, qui sont largement bordées érosées de blanc ou de jaune verdâtre.

fr. c.

CALADIUM porphyroneurum . . . . . 5 »

Feuilles à éclat métallique avec les nervures rouges anastomosées et simulant un réseau.

— Schmitzii . . . . . 4 »

Espèce distincte. Feuilles non peltées, arrondies à la base, ovées, presque acuminées au sommet, d'un beau vert veiné de rouge avec une large macule rougeâtre formée de points anastomosés s'étendant sur presque toute la surface.

— Schœlleri . . . . . 4 »

Feuilles nettement cordiformes à la base et non peltées, acuminées au sommet, d'un vert intense comme velouté ; le long des nervures primordiales est une bande blanche d'un effet brillant.

— Lowii . . . . . 50 »

Plante d'un très bel effet ; ses feuilles sont d'un vert métallique avec les nervures régulièrement blanches et très saillantes.

— splendidum . . . . . 8 »

Variété de l'ancien C. bicolor, et qui s'en distingue par la splendeur du coloris de ses feuilles. Les nervures sont largement bordées d'un rouge cocciné vif qui se fond graduellement avec le vert du limbe, tandis que le bord de la feuille est d'un beau vert clair.

— Veitchii . . . . . 50 »

Cette espèce, découverte à Bornéo par M. Th. Lobb, paraît être une des plus belles parmi les nombreuses espèces et variétés cultivées maintenant. Les feuilles, grandes et fermes, sont d'un vert foncé métallique en dessus, avec les bords et les principales nervures d'un blanc d'ivoire ; en dessous elles sont d'un violet sombre, livide, qui donne sous une certaine lumière un reflet bronzé à la face supérieure ; leur pétiole est curieusement bariolé de pourpre.

CEROPEGIA Gardneri . . . . . 4 »

Introduit récemment de Ceylan par M. Th. Lobb. Plante volubile, à feuilles lancéolées d'un vert livide en dessus, violacé en dessous, longues d'environ 9 centimètres sur 3 de large. Les fleurs, disposées en petites cymes, ont le tube blanchâtre finement ponctué de pourpre et le limbe large de 4 centimètres, maculé de violet sur fond blanc. Fleurit abondamment.

COLOCASIA albo-violacea . . . . . 15 »

Feuille très grande, d'un vert foncé en dessus, blanchâtre pruineuse en dessous, avec les nervures primordiales et le pétiole d'un violet sombre.

CROTON elegans . . . . . 5 »

Belle espèce à feuillage ornemental, introduite de l'Inde en 1861. Ses feuilles, longues et très étroites (environ 16 centimètres sur 1 1/2), sont d'un rouge foncé avec une large panachure centrale et des macules irrégulières d'un jaune d'or.

CYANOPHYLLUM speciosum . . . . . 10 »

Belle espèce du Mexique à feuillage ornemental, et dont le port rappelle celui du C. magnificum. Les feuilles, très grandes, sont d'un vert-olive pâle en dessus et d'un rouge vineux en dessous.

DRACÆNA rigidifolia . . . . . 8 »

Espèce curieuse par sa tenue droite et ferme.

DRACÆNA torminalis stricta . . . . . *suivant la force.* de 15 à 25 »

Feuilles moins longues et plus larges que celles du D. torminalis, devenant d'un beau rouge foncé à mesure qu'elles grandissent.

ECHITES argyræa . . . . . 12 »

Originaire du Brésil, où elle a été découverte par M. Libon. C'est une belle

fr. c.

plante grimpante à feuillage ornemental; les feuilles, grandes, d'une contexture ferme, sont d'un vert vif satiné et strié de lignes bien dessinées d'un blanc argenté.

ERYTHROCHITON hypophyllanthum . . . . . 25 »

Magnifique plante d'ornement pour la serre chaude, de la famille des *Diosmées*.

FRANCISCEA confertifolia variegata. . . . . 5 »

Jolie variété à feuilles panachées dont le type est déjà intéressant par ses fleurs violet foncé.

GARDENIA radicans foliis variegatis . . . . . 3 »

Cette variété, introduite du Japon en 1860, est une jolie acquisition pour la serre chaude, qu'elle orne par son feuillage panaché et par ses fleurs blanches, odorantes. La plante est naine et touffue; ses feuilles sont lancéolées étroites, irrégulièrement bordées de blanc, et ses fleurs, de la grandeur de celles du type, s'épanouissent aussi facilement.

GLOXINIA bird of paradise. . . . . 3 »

Fleur penchée, grande, rose lilacé pointillé de blanc de crème à la gorge.

— Brillant. . . . . 3 »

Fleur rose carmin riche ombré de cramoisi, lobes inférieurs ponctués de blanc.

— Constance . . . . . 3 »

Fleur dressée, cramoisi pourpre, bordée de mauve, à centre blanc.

— Diadem . . . . . 3 »

Fleur écarlate brillant, bordée de rose.

— Galatée. . . . . 3 »

— Hero . . . . . 3 »

Fleur dressée, cramoisi pourpre, bordée de mauve, avec une tache écarlate sur chaque lobe, centre blanc.

— Joanita . . . . . 3 »

Fleur rouge carminé, striée de blanc.

— Leander . . . . . 3 »

— Leviathan . . . . . 3 »

Fleur penchée, large, d'un beau rose, bord pourpre lilacé, tube jaunâtre.

— Most beautiful. . . . . 3 »

Fleur penchée, grande, blanc teinté de lilas, tube soufré pointillé rose et ligné de violet pourpre.

— pyramidalis. . . . . 8 »

Plante très belle, curieuse en ce qu'elle constitue un hybride entre le Gesneria Donkelaarii et les Gloxinia. Elle a le port et l'inflorescence en épi du premier, tandis que ses fleurs nombreuses, d'un rose brillant, sont aussi grandes que celles des Gloxinia à fleurs pendantes.

— Valérie . . . . . 4 »

Fleur dressée, rose carminé, bord plus clair, liséré de blanc, centre blanc pur.

GLOXINIA. Variétés hybrides de Sinningia.

— Evelina . . . . . 5 »

— Georgiana . . . . . 5 »

— Mademoiselle Alix . . . . . 5 »

— Mademoiselle Suzanne de la Bouillerie. . . . . 5 »

LISTE

DE GRAINES DE PLANTES RECOMMANDABLES

Classées d'après l'ordre de leur introduction dans nos Catalogues, depuis 12 années.

1850

	fr.	c.
Centranthus macrosiphon	»	40
Chænostoma fastigiatum	»	60
Coreopsis élégant marbré	»	40
Cuphea pourpre	»	40
Gaura Lindheimeri	»	40
Nemophila maculata	»	40
Podolepis chrysantha	»	60
Pourpier à grande fleur blanc strié	»	40
Schizanthus retusus blanc	»	60
Scyphanthus elegans	»	60
Venidium calendulaceum	»	60

1851

Calandrinia umbellata	»	60
Cosmos à grande fleur pourpre	»	60
Galane barbue écarlate	»	60
Nycterinia selaginoides	»	60
Reine-Marguerite, Pivoine variée	»	80

1852

Centaurea depressa	»	40
Escholtzia de Californie à fleur blanche	»	40
Gamolepis tagetes	»	40
Mimulus arlequin	»	60
OEillet de Gardner	»	60
OEillet d'Inde très nain jaune	»	40
Réséda à grande fleur	»	40
Salvia coccinea	»	60

1853

Amarantoïde orange	»	40
Cinéraire hybride naine	»	75
Collinsia multicolore	»	40
Coréopsis couronné	»	40
Gypsophila Steveni	»	40
Lin à grande fleur rouge	»	60
Myosotis alpestris	»	40
OEillet de la Chine blanc panaché	»	60
— — très nain	»	60
Perilla de Nankin	»	40
Pourpier à grande fleur orange	»	40
Rudbeckia fulgida	»	60

1854

Capucine petite à fleur écarlate	»	40
Coquelourde rose du ciel naine	»	40
Delphinium cardiopetalum	»	40
Giroflée grosse espèce grecque blanche	»	60
Ipomœa limbata	»	60

Suite de 1854

Pensée à grande fleur cuivrée	»	60
Soleil nain double	»	40

1855

Alonsoa Warscewiczii	»	60
Centranthus macrosiphon nain	»	40
Escholtzia tenuifolia	»	60
Leptosiphon aureus	»	60
Lin vivace à fleur blanche	»	40
Pentstemon Wrightii	»	60
Pensée à grande fleur violette bordée blanc	»	60
Salvia Rœmeriana	»	60
Soleil du Texas	»	40
Whitlavia grandiflora	»	40

1856

Acroclinium roseum	»	60
Canna Warscewiczii	»	60
Célosie à épi rose	»	40
Coréopsis élégant très nain pourpre	»	60
Godetia Schaminii	»	60
Immortelle à bractées naine jaune	»	60
— — naine blanche	»	60
Reine-Marguerite couronnée par couleurs	1	»
Salvia coccinea punicea	»	60
Soleil de Californie double	»	40

1857

Browallia Czerwickowski	»	60
Cosmidium Burridgeanum	»	60
Hesperis matronalis candidissima	»	40
Lupinus sulphureus	»	60
— Dunnetti superbus	»	60
— tricolor elegans	»	60
Pentstemon Hartwegii cæruleum	»	60
Pied-d'alouette vivace hybride	»	40
Reine-Marguerite à aiguilles par couleurs	1	»
— Chrysanthème naine variée	»	40
Ricin sanguin	»	50

1858

Aubergine tomate écarlate	»	60
Callirhoe pedata	»	60
Clarkia pulchella marginata	»	60
Datura Meteloides	»	60
Delphinium formosum	»	40
Lobelia Erinus grandiflora superba	»	60

Suite de 1858

Lobelia Erinus Lindleyana	»	60
— gracilis erecta	»	60
OEillet de la Chine très nain blanc panaché	»	60
Pourpier panaché rouge et blanc	»	40
Veronica syriaca	»	60

1859

Capucine Tom-Pouce	»	60
Chrysanthème à carène de Burridge	»	60
— — venustum	»	60
Coquelourde rose du ciel pourpre	»	60
Enothère de Drummond naine	»	60
Fenzlia dianthiflora	1	»
Maurandia Barclayana lilas	»	60
Reine-Marguerite géante empereur	1	»
Salvia coccinea punicea nana	»	60
Solanum Texanum	»	40

1860

Capucine T[illegible]ouce jaune	»	60
Clarkia pu[illegible] integripetala	»	60
Dracocepha[illegible]m Altaiense	»	60
Leptosipho[illegible]hybride	»	60
OEillet de l[illegible]Chine de Heddewig.	»	60
— — à pétales laciniés	»	60
Scabieuse naine carmin	»	40
— naine rose	»	40
Schizanthus grandiflorus oculatus	»	60
Spergula pilifera	»	60

1861

Capucine hybride de Lobb, variée	»	60
Celosia aurea pyramidalis	1	»
Clarkia pulchella Tom-Pouce	»	60
— pulchella integripetala marginata	»	60
Coreopsis cardaminefolia hybrida	»	60
Giroflée jaune-brune hâtive	»	40
Lobelia Erinus à fleur marbrée	»	60
Pensée Faust ou roi des noirs	1	»

1862

Clarkia élégant blanc carné double	»	60
Leptosiphon hybride acajou	1	»
Nemophila atomaria oculata	»	60
Tunica saxifraga	»	60
Zinnia élégant à fleur double	»	60

Paris. — Imprimerie de L. MARTINET, rue Mignon, 2.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)